



▲ XENPOZYME®
(Olipudase alfa)

sanofi



Diese Patientenkarte enthält wichtige Informationen, über die Sie bei Ihrer Behandlung mit XENPOZYME® informiert sein müssen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation oder scannen Sie den QR-Code.

PATIENTENKARTE

Name des Patienten:

Datum der Erstverordnung von XENPOZYME®:

Name des Zentrums:

Notfall-Telefonnummer des Zentrums:

Notarzt: 112

Name des behandelnden Arztes:

Telefonnummer des behandelnden Arztes:

Wichtige Nebenwirkungen

XENPOZYME® wird als intravenöse Infusion verabreicht. In seltenen Fällen kann bei Patienten während oder nach der Infusion eine starke allergische Reaktion auftreten, die sofort behandelt werden muss.

Wenn eines der folgenden Anzeichen und Symptome während oder nach der Infusion auftritt oder sich verschlimmert, **informieren Sie umgehend Ihren Arzt und nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch:**

- Kurzatmigkeit, Erstickungsgefühl
- Verwirrtheit, Schwäche- oder Ohnmachtsanfall
- Schneller und schwacher Puls
- Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall
- Hautrötung oder blasse Haut, Nesselsucht, Juckreiz

Berichten Sie bitte grundsätzlich jede Nebenwirkung Ihrem behandelnden Arzt.

Wichtige Informationen für Frauen im gebärfähigen Alter

Wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein, oder eine Schwangerschaft planen, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt über die Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zur Empfängnisverhütung während der Behandlung sowie bei Absetzen von XENPOZYME® bis 14 Tage nach der letzten Dosisgabe.