

Stoffe und Zubereitungen nach § 1 Nr. 1

Die Anlage enthält unter grundsätzlicher Verwendung der INN-Nomenklatur eine alphabetisch geordnete Auflistung der Stoffe und Zubereitungen.

Verschreibungspflichtig sind, sofern im Einzelfall nicht anders geregelt, auch Arzneimittel, die die jeweiligen Salze der nachfolgend aufgeführten Stoffe enthalten oder denen diese zugesetzt sind.

Unter äußerem Gebrauch im Sinne dieser Übersicht ist die Anwendung auf Haut, Haaren oder Nägeln zu verstehen.

Abacavir

Abamectin

Abarelis

Abatacept

Abemaciclib

Abirateron und seine Ester

Acamprosate

Acarbose

Acebutolol

Acecarbromal

Aceclidin

Aceclofenac

Acemetacin

Acenocoumarol

Acetanilid

Acetazolamid

Acetylcholin

- zur parenteralen Anwendung -

Acetylcystein

- ausgenommen zur oralen Anwendung bei akuten Erkältungskrankheiten bei Menschen -

Acetylsalicylsäure

- zur parenteralen Anwendung -

Aciclovir

- ausgenommen in Zubereitungen als Creme zur Anwendung bei Herpes labialis in Packungsgrößen bis zu 2 g und einem Wirkstoffgehalt bis zu 100 mg Aciclovir je abgeteilter Arzneiform

- ausgenommen in Zubereitungen als Creme in Kombination mit Hydrocortison in einer Konzentration von 1 Prozent Hydrocortison zur Behandlung von Herpes labialis zur Verringerung des Risikos von ulzerativen Läsionen bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren, in Packungsgrößen bis zu 2 g und mit einem Wirkstoffgehalt bis zu 100 mg Aciclovir je abgeteilter Arzneiform -

Acipimox**Acitretin****Aclarubicin****Acridinium-Salze****Aconitum: Arten der Gattung Aconitum, deren Pflanzenteile und Zubereitungen daraus sowie Aconitum-Alkaloide und deren Derivate**

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Salben -

- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Adapalene**Adefovir****Ademetionin****Adenosin****Afamelanotid****Afatinib****Aflibercept****Afoxolaner**

- zur Anwendung bei Tieren -

Agalsidase alfa und beta**Agaricinsäure****Aglepriston**

- zur Anwendung bei Tieren -

Agomelatin

Ajmalin und seine Ester

N²-L-Alanyl-L-glutamin

- zur parenteralen Anwendung -

Alatrofloxacin**Albendazol****Albiglutid****Alclofenac**

Alclometason und seine Ester

Aldesleukin

Aldosteron und sein Halbacetal

Alectinib

Alendronsäure

Alfacalcidol

Alfadolon und seine Ester

Alfatradiol

- ausgenommen zur Anwendung auf der Kopfhaut bei leichter androgenetischer Alopezie (hormonell bedingter Haarausfall) bei Personen ab einem Alter von 18 Jahren -

Alfaxalon

Alfuzosin

Alglucosidase alfa

Alipogen Tiparvovec

Aliskiren

Alitretinoin

Alizaprid

Alkuronium-Salze

N-Alkyl-atropinium-Salze

Allopurinol

Allylestrenol

Almotriptan

- ausgenommen zur akuten Behandlung der Kopfschmerzphase bei Migräneanfällen mit und ohne Aura bei Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren, nach der Erstdiagnose einer Migräne durch einen Arzt, in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung in Konzentrationen von 12,5 mg je abgeteilter Form und in einer Gesamtmenge von 25 mg je Packung -

Alogliptin

Alprenolol

Alprostadil

Alteplase

Altrenogest

- zur Anwendung bei Tieren -

Altretamin

Amantadin

Amibenonium-Salze

Ambrisentan

Ambroxol

- zur parenteralen Anwendung -

Ambutoniumbromid

Amcinonid

Ameziniummetilsulfat

Amifampridin

Amifostin

Amikacin

Amilomer

Amilorid

4-Aminobenzoessäure

- sofern nicht auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 1,5 g angegeben ist -

Aminocaprinsäure

Aminoglutethimid

4-Amino-2-hydroxybenzoessäure und ihre Derivate

4-(Aminomethyl)benzoessäure

- zur oralen und parenteralen Anwendung -

5-Amino-4-oxopentansäure

Aminopterin

Amiodaron

Amiphenazol

Amisulprid

Amitraz

- zur Anwendung bei Bienen und Schweinen -

Amitriptylin

Amitriptylinoxid

Amlexanox

Amlodipin

Amodiaquin

Amoxicillin

Amperozid

- zur Anwendung bei Tieren -

Amphotericin B

Ampicillin

Amprenavir

Amprolium

- zur Anwendung bei Tieren, ausgenommen zur Anwendung bei Brieftauben -

Amrinon

Amsacrin

Amygdalarum amararum aethereum, Oleum (blausäurehaltiges)

Amylenhydrat

Anageston

Anagrelid

Anakinra

Anastrozol

Ancrod

Androstanolon und seine Ester

Androstenon

- zur Anwendung bei Tieren -

Anetholtrithion

Angiotensinamid

Anidulafungin

Anistreplase

Antimonverbindungen

- ausgenommen Antimon(III)-sulfid und Antimon(V)-sulfid -

Antithrombin-III

Aortenklappe vom Schwein, denaturiert

Apalcillin

Apiol

Apixaban

Apomorphin

Apraclonidin

Apramycin

- zur Anwendung bei Tieren -

Apremilast

Aprepitant

Aprindin

Apronalid

Aprotinin

Ardeparin

- zur parenteralen Anwendung -

Arecolin

Argatroban

Argininoxogluurat

Aripiprazol

Arsen und seine Verbindungen

Artemether

Artenimol und seine Ester und Ether

Articain

Ascaridol

Asenapin

Asfotase alfa

Asparaginase

Aspidinofilizin

Astemizol

Ataluren

Atazanavir

Atenolol

Atipamezol

- zur Anwendung bei Tieren -

Atomoxetin

Atorvastatin

Atosiban

Atovaquon

Atracurium-Salze

Atropin

Auranofin

Aurothioglucose

Avanafil

Avibactam

Aviptadil

Axitinib

Azacididin

Azacosterol

Azamethonium-Salze

Azaperon

Azapropazon

Azatadin

Azathioprin

Azelainsäure

Azelastin

- ausgenommen zur intranasalen Anwendung zur Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis bei Erwachsenen und Kindern ab dem vollendeten 6. Lebensjahr -

- ausgenommen zur Anwendung am Auge -

Azidamfenicol, seine Ester und Verbindungen

Azidocillin

Azilsartan und seine Ester

Azithromycin

Azlocillin

Azosemid

Aztreonam

Bacampicillin

Bacillus Calmette-Guérin

Bacitracin

- ausgenommen Zubereitungen zur örtlichen Anwendung bei Menschen auf Haut oder Schleimhaut, sofern sie je Stück abgeteilter Arzneiform oder bei sonstigen Zubereitungen je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 500 I.E. (9,1 mg) Bacitracin enthalten -

Baclofen

Bambuterol

Bamifyllin

Baricitinib

Bazedoxifen und seine Ester

Becaplermin

Beclamid

Beclometason und seine Ester

- ausgenommen Beclometasondipropionat zur intranasalen Anwendung bei Erwachsenen zur symptomatischen Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis, nach der Erstdiagnose einer saisonalen allergischen Rhinitis durch einen Arzt, in einer Tagesdosis bis zu 400 Mikrogramm Beclometasondipropionat, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen angegeben ist, dass die Anwendung auf Erwachsene beschränkt ist -

Bedaquilin

Befunolol

Belatacept

Belladonnae folium und ihre Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Bemegrid

Bemetizid

Bemiparin

- zur parenteralen Anwendung -

Benactyzin

Benazepril

Bencyclan

Bendamustin

Bendroflumethiazid

Benfurodil und seine Ester

Benmoxin

Benperidol

Benserazid

Bentiromid

Benzaldehydcyanhydrin

Benzaldehyd-thiosemicarbazon und seine Derivate

Benzatropin

Benzbromaron

Benzetimid

- zur Anwendung bei Tieren -

Benziloniumbromid

Benzocain

- ausgenommen Arzneimittel zum Aufbringen auf die Haut oder Schleimhaut, außer zur Anwendung am Auge -

Benzocetamin

Benzthiazid

Benzydamin

- ausgenommen zur Anwendung im Mund- und Rachenraum

a) als Lösung mit einer Benzydaminhydrochlorid-Konzentration von maximal 1,5 mg/ml oder

b) als Lutschtablette mit maximal 3 mg Benzydaminhydrochlorid pro abgeteilter Form -

Benzyhydrochlorothiazid

Benzympenicillin und seine Ester

Betäubungsmittel, soweit sie Zubereitungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Betäubungsmittelgesetzes sind

Betahistin

Betain

- zur adjuvanten Therapie der Homocystinurie - **Betamethason** und seine Ester

Betanidin

Betaxolol

Betiatid

- als Trägersubstanz für (^{99m}Tc) Technetium -

Bevonium-Salze

Bexaroten

Bezafibrat

Bicalutamid

Bicisat

- als Kit zur Herstellung eines Radiodiagnostikums mit (^{99m}Tc) Technetium –

Bictegravir

Bilastin und seine Ester

Bimatoprost

Binimetinib und seine Ester

Biperiden

Birkenrinden-Trockenextrakt

(gereinigter Trockenextrakt von geeigneten Betula-Arten mit weißer Rinde [100 mg aus 0,5 bis 1,0 g Birkenrinde], entsprechend 72 bis 88 Prozent Betulin)

- zur Behandlung von oberflächlichen Hautwunden (Epidermis und obere Dermis) und Verbrennungswunden der Haut des Grades IIa bei Erwachsenen -

2,5-Bis-(aziridin-1-yl)-3,6-bis(2-methoxyethoxy)-1,4-benzochinon

Bismut und seine Verbindungen

- zur oralen Anwendung -
- zur intramammären Anwendung beim Rind -
- ausgenommen in Tagesdosen bis zu 1,5 g Bismut und in Packungsgrößen bis zu 50 g Bismut; diese Ausnahme gilt nicht für Bismut (III)-citrat-hydroxid-Komplex -

Bisoprolol

Bithionoloxid

Bitoscanat

Bittermandelwasser

Bivalirudin

Bleiacetat

- ausgenommen Bleiessig -

Blei(II)-Iodid

Bleomycin

Blutgerinnungsfaktoren und Gerinnungsinhibitoren, jeweils rekombinant

Blutzubereitungen humanen Ursprungs

- zur arzneilichen Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper -

Boceprevir

Boldenon und seine Ester

Bopindolol

Bornaprin

Bortezomib

Bosentan

Bosutinib

Bretylium-Salze

Brexiprazol

Brigatinib

Brimonidin

Brinzolamid

Brivaracetam

Brivudin

Bromelain-Proteasen-Konzentrat

- zum äußeren Gebrauch bei Erwachsenen mit tiefen thermischen Verletzungen (Grad IIb – III) -

Bromethan

Bromfenac und seine Ester

Bromisoval

Bromociclen

Bromocriptin

Bromofenofos und seine Ester

Bromoform

Bromoprid

Bromperidol

Brotianid

- zur Anwendung bei Tieren -

Brucin

Buclizin

Budesonid

Budipin

Bufeniod

Buflomedil

Bumadizon

Bumetanid

Bunamidin

- zur Anwendung bei Tieren -

Bunazosin

Bunitrolol

Bupivacain

Bupranolol

Bupropion

Buserelin

Buspiron

Busulfan

Butalamin

Butamirat

Butenafin

Butizid

Butorphanol und seine Ester

Butylchloralhydrat

Butylscopolamin

- zur parenteralen Anwendung -

C1-Inhibitor vom Menschen

Cabazitaxel und seine Ester

Cabergolin

Cabozantinib

Cactinomycin

Calabar semen und seine Zubereitungen

Calcifediol

Calcipotriol

Calcitonin sowie Calcitonin enthaltende Organzubereitungen

Calcitriol

Calciumdobesilat

Cambendazol

- zur Anwendung bei Tieren -

Cannabidiol

Canagliflozin und seine Derivate

Candesartan und seine Ester

Cangrelor und seine Ester

Canrenoinsäure und ihre Ester

Cantharides und ihre Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen -

Cantharidin

Capecitabin

Capreomycin

Capsaicin und seine Ester

- zur Behandlung von peripheren neuropathischen Schmerzen -

Captodiam

Captopril

Caramiphen

Carazolol

Carbachol

Carbamazepin

N-[2-(Carbamoyloxy)propyl]-N,N,N- trimethylammoniumhydroxid

Carbenicillin

Carbenoxolon

Carbetocin

Carbidopa

Carbimazol

Carbocistein

Carboplatin

N-(Carboxymethyl)-N-[2-oxo-(2,4,5-trimethylanilino)ethyl]glycin

– als Trägersubstanz für (99m Tc) Technetium –

Carbromal

Carbuterol

Carfecillin

Carfilzomib

Carglumsäure

Carindacillin

Cariprazin
Carisoprodol
Carmustin
L-Carnitin
- zur parenteralen Anwendung -
Carprofen
Carteolol
Carvedilol
Carzinophillin
Caspofungin
Catalase
Cefacetril
Cefaclor
Cefadroxil
Cefalexin
Cefalonium
- zur Anwendung bei Tieren -
Cefaloridin
Cefalotin
Cefamandol und seine Ester
Cefapirin
Cefapirin-Benzathin (2:1)
- zur Anwendung beim Rind -
Cefazedon
Cefazolin
Cefepim
Cefetamet und seine Ester
Cefixim
Cefmenoxim
Cefodizim
Cefoperazon
Cefotaxim
Cefotetan
Cefotiam
Cefovecin
- zur Anwendung bei Tieren -
Cefoxitin
Cefpodoxim und seine Ester
Cefquinom

Cefradin
Cefsulodin
Ceftarolinfosamil und seine Ester
Ceftazidim
Ceftibuten
Ceftiofur
Ceftizoxim
Ceftobiprol und seine Derivate
Ceftolozan und seine Ester
Ceftriaxon
Cefuroxim und seine Ester
Celecoxib
Celiprolol
Cenegermin
Ceritinib
Cerliponase alfa
Certoparin
- zur parenteralen Anwendung -
Ceruletid
Cetrorelix
Chenodesoxycholsäure
Chenopodii anthelminthici, Oleum
Chinidin
Chinin
- zur Anwendung beim Menschen -
Chloralformamid
Chloralhydrat
Chloralose
Chlorambucil
Chloramphenicol und seine Ester sowie deren Verbindungen
Chlorcyclizin
Chlorisondamin
Chlormadinon und seine Ester
Chlormethaqualon
Chlormethin
Chlormethin-N-oxid
Chlormezanon
Chlornaphazin

Chloroform

- ausgenommen Zubereitungen zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 50 Gewichtsprozenten -

Chloroprocain

Chloroquin

Chlorothiazid

Chlorotrianisen

Chlorphenamin

- zur Anwendung bei Tieren -

Chlorpropamid

Chlorprothixen

Chlortalidon

Chlortetracyclin

Chlorzoxazon

Cholsäure

Chondroitinpolysulfat

- zur parenteralen Anwendung -

Choriogonadotropin

Choriogonadotropin alfa

Chrysoidin

Chymopapain

- zur parenteralen Anwendung -

Ciclacillin

Ciclesonid

Cicletanin

Ciclonium-Salze

Ciclopirox

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch bei Erwachsenen und Schulkindern -

Ciclosporin

Cidofovir

Cilazapril

Cilostazol

Cimetidin

Cimicoxib

- zur Anwendung bei Tieren -

Cinacalcet

Cinchocain

Cinchophen und seine Ester

Cinnarizin

Cinoxacin

Ciprofloxacin
Cisaprid
Cisatracurium-Salze
Cisplatin
Citalopram
Cladribin
Clanobutin
- zur Anwendung bei Tieren -
Clarithromycin
Clavulansäure
Clenbuterol
Clevidipin
Clidiniumbromid
Clindamycin und seine Ester
Clioquinid
Clobetasol-17-propionat
Clobetasonbutyrat
Clocortolon und seine Ester
Clodronsäure
Clofarabin
Clofazimin
Clofenamid
Clofezon
Clofibrinsäure und ihre Ester
Clomethiazol
Clomifen
Clomipramin
Clonidin
Clopamid
Clopenthixol und seine Ester
Clopidogrel
Clopidol
Cloprednol
Cloprostenol
- zur Anwendung bei Tieren -
Clorexolon
Clorindion
Closantel
- zur Anwendung bei Tieren –

Clostebol und seine Ester

Clostridium botulinum Neurotoxin Typ A (frei von Komplexproteinen)

Clostridium botulinum Toxin Typ A und B

Clotrimazol

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -
- ausgenommen zur vaginalen Anwendung in Packungsgrößen mit einer Gesamtmenge von bis zu 600 mg Clotrimazol, verteilt auf bis zu 3 Einzeldosen, und für eine Anwendungsdauer bis zu 3 Tagen -

Cloxacillin

Clozapin

Cobicistat

Cobimetinib und seine Derivate

Coffein

- in Zubereitungen mit einem oder mehreren der folgenden analgetisch wirksamen Stoffe

a) **Paracetamol**

b) **Pyrazolonderivate**

c) **Salicylsäurederivate**

(ausgenommen in Einzeldosen bis zu 0,5 g und einer Gesamtmenge bis zu 10 g je Packung für die analgetischen Wirkstoffe)

- in Zubereitungen zur Behandlung der primären Apnoe bei Frühgeborenen -

Colchici flos, semen et tuber und ihre Zubereitungen

Colchicumalkaloide, auch hydrierte

Colecalciferol

- ausgenommen in Zubereitungen

a) zur Anwendung bei Menschen, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 1 000 I.E. (entspricht 0,025 mg) Colecalciferol angegeben ist,

b) zur Anwendung bei Tieren, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 10 000 I.E. (entspricht 0,25 mg) Colecalciferol angegeben ist -

Colesevelam

Colestilan

Colestipol

Colestyramin

Colistimethat-Natrium und andere Colistimethat-Salze

Colistin

Colocynthis fructus und ihre Zubereitungen

Conii herba und seine Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben und ähnlichen Zubereitungen und als Zusatz zu erweichenden Kräutern -

Coniin

Convallaria-Glykoside

Corifollitropin alfa

Corticorelin vom Menschen

Corticotropin, auch funktionelle Teilstücke

Cortison und seine Ester

Coumafos

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Coumessigsäure und ihre Ester

Crizotinib**Cropropamid**

- ausgenommen Zubereitungen

a) zur Anwendung bei Menschen, sofern sie je Stück abgeteilter Arzneiform nicht mehr als 25 mg oder als Injektionslösung nicht mehr als 75 mg je Milliliter enthalten,

b) zur Anwendung bei Tieren, sofern sie in Zubereitungen zur oralen oder nasalen Anwendung nicht mehr als 75 mg je Milliliter enthalten -

Crotonis oleum

Crotonis semen und seine Zubereitungen

Crufomat

Curare und seine Zubereitungen

Cyacetacid**Cyanwasserstoff**

- ausgenommen als Stabilisator in Zubereitungen zur oralen und parenteralen Anwendung in Tagesdosen bis zu 100 µg, bezogen auf den Cyanid-Gehalt -

Cyclodrin**Cyclofenil****Cyclopenthiazid****Cyclopentolat****Cyclophosphamid****Cycloserin****Cyclothiazid****Cyproheptadin**

Cyproteron und seine Ester

Cytarabin**Cytisin**

Dabigatran und seine Ester

Dabrafenib**Dacarbazin****Daclatasvir****Dactinomycin**

Dalbavancin und seine Ester

Dalfopristin**Dalteparin**

- zur parenteralen Anwendung -

Danaparoid

Danazol

Danofloxacin

Dapagliflozin und seine Ester

Dapiprazol

Dapoxetin

Dapson

Daptomycin

Darbepoetin alfa

Darifenacin

Darunavir

Dasabuvir

Dasatinib

Daturae-Arten und ihre Zubereitungen

-ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung aus oberirdischen Teilen von *Datura stramonium* zur Blütezeit, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Daunorubicin

Deanol

- ausgenommen Zubereitungen, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 50 mg, berechnet als Deanol, angegeben ist -

Decitabin und seine Ester

Deferasirox

Deferipron

Deferoxamin

Defibrotid

Deflazacort

Defosfamid

Degarelix

Delamanid

Delapril

Delmadinon und seine Ester

Dembrexin

- zur parenteralen Anwendung bei Tieren -

Demecariumbromid

Demeclocyclin

Demecolcin

Demegeston

Demelverin

Denaverin

Depreotid

Desfesoterodin

Desfluran

Desipramin

Desirudin

Desloratadin

- ausgenommen Arzneimittel in der oralen Anwendung zur symptomatischen Behandlung bei allergischer Rhinitis und Urtikaria bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab zwei Jahren, es sei denn, es handelt sich um von der Europäischen Kommission als verschreibungspflichtig zugelassene Arzneimittel -

Deslorelin

- zur Anwendung bei Tieren -

Desmeninol

Desmopressin

Desogestrel

Desonid

Desoximetason

Desoxycorton, seine Ester und Glukosidverbindungen

Destomycin A

- zur Anwendung bei Tieren -

Detajmiumbitartrat

Detomidin

Dexamethason und seine Ester

- ausgenommen Dexamethasondihydrogenphosphat zur einmaligen parenteralen Anwendung in wässriger Lösung in Ampullen/Fertigspritzen mit 40 mg Wirkstoff und bis zu maximal 3 Packungseinheiten (entsprechend 120 mg Wirkstoff) für die Notfallbehandlung schwerer anaphylaktischer Reaktionen beim Menschen nach Neuraltherapie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes -

Dexibuprofen

Dexketoprofen

Dexlansoprazol

Dexmedetomidin

Dexrazoxan

Dextrane

- zur intravenösen Anwendung -

Dextrofemin

Dextrothyroxin

Diacetylnalorphin

Diacetylsplenopentin

4,4'-Diamino-2,3',5',6-tetraiod-diphenylsulfon

Diazoxid

Dibekacin

Dibenzepin

***N,N*-Dibenzyl-*N*-(2-chlor-ethyl)-amin**

Dibotermin alfa

1,2-Dibromethan

1,1-Dichlorethan

1,2-Dichlorethan

Dichlorvos

Diclazuril

Diclofenac

- ausgenommen zur cutanen Anwendung, außer als Pflaster, in Konzentrationen bis zu 5 % mit Ausnahme der Anwendung bei Thrombophlebitis superficialis und aktinischer Keratose -
- ausgenommen zum äußeren Gebrauch als Pflaster ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Wirkstoffmenge bis zu 140 mg (berechnet als Diclofenac-Natrium) je abgeteilter Arzneiform -
- ausgenommen bei oraler Anwendung zur Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen und Fieber in einer Dosierung bis 25 mg je abgeteilter Form und einer Tagesdosis von 25 bis maximal 75 mg für eine maximale Anwendungsdauer von drei (Antipyrese) oder vier (Analgesie) Tagen –

Diclofenamid

Dicloxacillin

Dicoumarol

Dicyclanil

- zur Anwendung beim Schaf -

Didanosin

Dienestrol

Dienogest

Diethylcarbamazin

1-{2-[2-(Diethylmethylazaniumyl)ethoxy]ethyl}-1-methylpyrrolidiniumdiiodid

Diethylstilbestrol

Diethyl(4-nitrophenyl)phosphat

Diflorason-17,21-diacetat

Difloxacin

Diflucortolon und seine Ester

Diflunisal

Digitalis folium, glykosidhaltiges und seine Zubereitungen

Digitalis-Wirkstoffe, genuine und teilabgebaute Glykoside

- ausgenommen Digitoxin zum äußeren Gebrauch, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 0,0015 g angegeben ist -

Dihydralazin

***N*-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)-3-methoxypropan-1-amin**

Dihydrocuprein und seine Derivate

Dihydroergocornin

Dihydroergocristin

Dihydroergocryptin

Dihydroergotamin

Dihydrostreptomycin

Dihydrotachysterol

Dilazep

Diltiazem

Dimenhydrinat

- zur parenteralen Anwendung -

Dimepranol(4-acetamidobenzoat)

2,3-Dimercapto-1-propansulfonsäure

Dimetacrin

Dimetamfetamin

Dimethisteron

(3-Dimethylamino-2-hydroxypropyl)-(4-propylamino-benzoat)

4-Dimethylaminophenol

Dimethylfumarat

- zur oralen Anwendung -

O,O'-Dimethyl-O''-(4-sulfamoyl-phenyl)thiophosphat

O-(4-Dimethylsulfamoylphenyl)-O',O''-dimethylthiophosphat

Dimethylsulfoxid

- ausgenommen zur cutanen Anwendung bei Menschen in einer Konzentration bis zu 15 % -

Dimethyltubocurarin

Dimetinden

- zur parenteralen Anwendung -

Dimetridazol

- zur Anwendung bei Tieren -

Dinoprost

Dinoproston

Dinotefuran

- zur Anwendung bei Tieren -

Di(L-(+)-ornithin)-(2-oxo-glutarat)-hydrat-diphosphonsäure

- als Trägersubstanz für (^{99m}Tc) Technetium -

1,1-Dioxo-3-(2-phenylethyl)-6-trifluormethyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid

Diphenhydramin

- zur parenteralen Anwendung -

3,3-Diphosphono-1,2-propandicarbonsäure

- als Trägersubstanz für (^{99m}Tc) Technetium -

Dipiproverin

Dipivefrin

Dipyridamol

Dirlotapid

- zur Anwendung bei Tieren -

Disopyramid

Distigmin

Disulfiram

Distickstoffmonoxid

- zur inhalativen Anwendung -

Dithranol

Dobutamin

Docetaxel

Dofetilid

Dolasetron

Dolutegravir

Domperidon

Donepezil

Dopamin

Dopexamin

Doramectin

Doravirin

Doripenem

Dornase alfa

Dorzolamid

Dosulepin

Doxapram

Doxazosin

Doxepin

Doxorubicin

Doxycyclin

Doxylamin

- zur Behandlung von Schlafstörungen bei Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr -

Droloxifen

Dronedaron

Dropempin

Droperidol

Drospirenon

Drostanolon und seine Ester

Dulaglutid

Duloxetine

Dutasterid

Dydrogesteron

Ebastin

Econazol

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Ecothiopat

Edotreotid

- als Kit zur Herstellung eines Radiodiagnostikums mit (⁶⁸Ga)Gallium -

Edoxaban

Edoxudin

Efavirenz

Eflornithin

Eisen(III)-citrat-Hydrat, basisches

Eisen(III)-hexacyanoferrat(II)

Eisen(III)-hydroxid-oxid-Sucrose-Stärke-Gemisch

Eisen(III)-Maltol

Eisen-Verbindungen

- zur parenteralen Anwendung, ausgenommen zur Prophylaxe der Eisenmangelanämie bei Säugferkeln, sofern dies als alleiniger Anwendungsbereich auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen angegeben ist -

Elbasvir

Eletriptan

Eliglustat und seine Ester

Elosulfase alfa

Eltrombopag

Eluxadolin

Elvitegravir und seine Ester

Emedastin

Emepronium-Salze

Emetin

Empagliflozin

Emtricitabin

Emylcamat

Enalapril

Enalaprilat

Encorafenib

Endomid

Enfluran

Enfuvirtid

Enoxacin

Enoxaparin

-zur parenteralen Anwendung -

Enoximon

Enrofloxacin

- zur Anwendung bei Tieren -

Entacapon

Entecavir

Enzalutamid

Enzyme, proteolytisch, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs

- zur parenteralen Anwendung -

Ephedra-Arten und Zubereitungen aus Ephedra-Arten

- zur oralen Anwendung, ausgenommen homöopathische Zubereitungen aus Ephedra in höheren Verdünnungen als D1 sowie ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Ephedrin

- zur oralen Anwendung

a) in Zubereitungen, denen als wirksamer Bestandteil nur dieser Stoff oder dieser Stoff zusammen mit Coffein zugesetzt ist,

b) in anderen Zubereitungen, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Einzeldosis von mehr als 10 mg oder bei Retardzubereitungen eine Tagesdosis von mehr als 40 mg, berechnet als Ephedrinbase, angegeben ist oder diese Zubereitungen Coffein enthalten

- zur parenteralen Anwendung -

Epicillin

Epimestrol

Epinastin

Epinephrin

- ausgenommen Autoinjektoren in Packungsgrößen von einer Einheit zur einmaligen parenteralen Anwendung für die Notfallbehandlung schwerer anaphylaktischer Reaktionen beim Menschen nach Neuraltherapie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes -

Epirubicin

Eplerenon

Poetin alfa, beta, delta, theta und zeta

Epoprostenol und seine Derivate

Eprazinon

Eprinomectin

Eprosartan

Eptifibatid

Eptotermin alfa

Erdostein

Ergocalciferol

- ausgenommen Zubereitungen

a) zur Anwendung bei Menschen, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 1 000 I.E. Ergocalciferol angegeben ist,

b) zur Anwendung bei Tieren, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 10 000 I.E. Ergocalciferol angegeben ist -

Eribulin und seine Derivate

Eritrityltetranitrat und andere Nitrat-Derivate des Erythritols

Erlotinib

Ernährungslösungen unter Verwendung von Kohlenhydraten, kalorienhaltigen Zuckeraustauschstoffen, Fettemulsionen oder glucogenen oder ketogenen Aminosäuren

- zur parenteralen Anwendung -

Ertapenem

Ertugliflozin und seine Ester

Erythromycin und seine Ester

Escherichia coli, lebend

- zur Anwendung bei Tieren -

Esketamin

Eslicarbazepin und seine Ester

Esmolol

Esomeprazol

- ausgenommen zur Behandlung von Sodbrennen und saurem Aufstoßen in einer Einzeldosis von 20 mg und in einer Tageshöchstdosis von 20 mg für eine maximale Anwendungsdauer von 14 Tagen und in einer maximalen Packungsgröße von 280 mg Wirkstoff -

Estradiol und seine Ester

Estramustin-17-dihydrogenphosphat

Estriol

Estrogene, konjugierte

Etacrynsäure

Etafenon

Etamsylat

- zur Anwendung bei Tieren -

Etanercept

Etaqualon

Etelcalcetid

Ethadion

Ethambutol

Ethiazid

Ethinylestradiol und seine Ester

Ethionamid

Ethisteron

Ethosuximid

6-Ethoxy-2-benzothiazolsulfonamid

Ethylbenzhydramin

Ethylestrenol und seine Ester

2-Ethylhex-2-enal

- zur Anwendung bei Tieren -

Ethylhydrogenfumarat

- zur oralen Anwendung -

Ethylnitrat

Etidocain

Etidronsäure

Etiproston

- zur Anwendung bei Rindern -

Etiroxat

Etodolac

Etodroxizin

Etofenamat

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Etofibrat

Etofillinclofibrat

Etoloxamin

Etomidat

Etonogestrel

Etoposid

Etoricoxib

Etozolin

Etravirin

Etretinat

Etynodiol und seine Ester

Everolimus

Exametazim

Exemestan

Exenatid

Ezetimib

Famciclovir

Famotidin

- ausgenommen in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung in einer Konzentration von bis zu 10 mg je abgeteilter Form und in Packungsgrößen bis zu 140 mg, sofern die Anwendung für Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr auf die Anwendungsgebiete „zur Kurzzeitanwendung bei Sodbrennen und/oder saurem Aufstoßen“ und auf eine maximale Therapiedauer von 14 Tagen beschränkt ist -

Fampridin

Febantel

- zur Anwendung bei Tieren -

Febuprol

Febuxostat

Felbamat

Felodipin

Fenbendazol

- zur Anwendung bei Tieren -

Fenbufen

Fenbutrazat

Fenclofos

Fendilin

Fenfluramin

Fenofibrat

Fenoprofen

Fenoterol

- ausgenommen zur Notfalltokolyse in Zubereitungen von 25 µg zur Auflösung in 4 ml Infusionslösung zur langsamen (über 2 - 3 Minuten) Bolusinjektion in einer Packungsgröße von bis zu 5 Ampullen zur Abgabe an Hebammen und Entbindungspfleger für den Praxisbedarf -

Fenprostalen

- zur Anwendung bei Tieren -

Fenthion

Fentoniumbromid

Fenyramidol

Fertirelin

- zur Anwendung bei Tieren -

Ferucarbotran

- zur Darstellung herdförmiger Leberschäden in der Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) -

Ferumoxytol

Fesoterodin

Fexofenadin

Fibrinolytin (human)

Fidaxomicin und seine Derivate und Analoga

Filgrastrim

Filicis rhizoma und seine Zubereitungen

Finasterid

Fingolimod und seine Derivate

Firocoxib

- zur Anwendung bei Tieren -

Flecainid

Fleroxacin

Flomoxef

Flopropion

Florfenicol

Fluanison

Flubendazol

- zur Anwendung bei Tieren -

Flucloxacillin

Fluconazol

Flucytosin

Fludarabin-5'-dihydrogenphosphat

Fludeoxyglucose (¹⁸F)

Fludrocortison und seine Ester

Fludroxycortid

Flufenaminsäure

- ausgenommen zur cutanen Anwendung -

Flumazenil

Flumetason und seine Ester

Flumethrin

- zur Anwendung beim Rind -

Flunarizin

Flunisolid

Flunixin

- zur parenteralen Anwendung bei Tieren -

- zur Anwendung bei Hunden -

Fluocinolonacetonid

Fluocinonid

Fluocortin-Butyl

Fluocortolon und seine Ester

Fluorescein

- zur parenteralen Anwendung -

Fluoride, lösliche,

- sofern nicht auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis angegeben ist, die einem Fluorgehalt bis zu 2 mg entspricht -

- ausgenommen in Zubereitungen als Gel zur lokalen Anwendung an den Zähnen in Packungsgrößen bis zu 25 g, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen angegeben ist, dass die Anwendung auf Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr sowie auf eine einmalige Dosis pro Woche, die einem Fluorgehalt bis zu 7 mg entspricht, beschränkt ist -

Fluorometholon und seine Ester

Fluorouracil

Fluorphenylalanin

Fluostigmin

Fluoxetin

Fluoxymesteron und seine Ester

Flupentixol

Flupirtin

Flupredniden und seine Ester

Fluprostenol

- zur Anwendung bei Tieren -

Fluralaner

- zur Anwendung bei Tieren -

Flurbiprofen

- ausgenommen zur Anwendung im Mund- und Rachenraum zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut in einer Tageshöchstdosis von 50 mg -

Fluspirilen

Flutamid

Fluticason und seine Ester

- ausgenommen Fluticasonpropionat zur intranasalen Anwendung bei Erwachsenen zur symptomatischen Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis, nach der Erstdiagnose einer saisonalen allergischen Rhinitis durch einen Arzt, in einer Tagesdosis bis zu 200 Mikrogramm Fluticasonpropionat, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen angegeben ist, dass die Anwendung auf Erwachsene beschränkt ist -

Fluvastatin

Fluvoxamin

Folinsäure

- zur parenteralen Anwendung in der Behandlung von Krebs- oder Rheumaerkrankungen -

Follitropin und seine rekombinanten Glycoformen alfa, beta und delta

Fomepizol

Fominoben

Fomivirsen

Fomocain

- ausgenommen Arzneimittel zum Aufbringen auf die Haut oder Schleimhaut, außer zur Anwendung am Auge -

Fondaparinux

Formestan

Formocortal

Formoterol

Fosamprenavir

Fosaprepitant

Foscarnet

- zur cutanen und parenteralen Anwendung -

Fosfestrol
Fosfomycin
Fosinopril
Framycetin
Frovatriptan
Fulvestrant
Furaltadon
Furazolidon
Furosemid
Fusidinsäure und ihre Ester

Gabapentin
Galantamin
Gallamin
Gallopamil
Galsulfase
Gamithromycin
- zur Anwendung bei Tieren -

Ganciclovir
Ganirelix
Gatifloxacin
Gaxilose
Gefitinib

Gelsemii rhizoma und seine Zubereitungen
- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Gemcitabin

Gentransfer-Arzneimittel

Gemeprost

Gemfibrozil

Gentamycin

Gepefrin

Gestoden

Gestonoron

Gewebetransplantate, humane allogene und Produkte aus Gewebezüchtungen

Gitoformat

Glafenin

Glatiramer

Glecaprevir

Glibenclamid

Glibornurid

Gliclazid

Glimepirid

Glipizid

Gliquidon

Glisoxepid

Glucagon

Glucametacin

Glucosamin

- ausgenommen zur oralen Anwendung -

Glycerolphenylbutyrat

Glyceroltrinitrat

Glycopyrroniumbromid

Glymidin

Goldfliegenlarve, lebend

Gold-Keratin-Komplex

Gonadorelin

Gonadotropin (humanes und Pferdeserum)

Goserelin

Granisetron

Grapiprant

- zur Anwendung bei Tieren -

Grazoprevir

Grepafloxacin

Griseofulvin

Grünteelblätter-Trockenextrakt

(gereinigter Trockenextrakt aus *Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze (45 – 56:1),
entsprechend 55 – 72% (-)-Epigallocatechin-3-(3,4,5-trihydroxybenzoat))

Guanabenz

Guanacilin

Guanethidin

Guanfacin

Guanidin, auch an Eiweiß gebunden

Guanoxan

Gutti und seine Zubereitungen

Halcinonid

Halofantrin

Halofuginon

- zur Anwendung bei Tieren -

Halometason

Haloperidol und seine Ester

Halothan

Haloxon

(¹³C) Harnstoff

(¹⁴C) Harnstoff

Hemoglobinglutamer

- zur Anwendung bei Tieren -

Heparine

- zur parenteralen Anwendung -

Hetacillin

Hexachlorethan

- zur Anwendung bei Tieren -

Hexachlorophen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 1 Gewichtsprozent -

Hexacyclonsäure

Hexamethonium-Salze

Hexcarbacholinbromid

Hexobendin

Hexoprenalin

Hexyl(5-amino-4-oxopentanoat)

Histamin

- ausgenommen

a) Zubereitungen zum oralen Gebrauch, sofern sie je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 0,4 mg Histamin-Salz enthalten und tropfenweise eingenommen werden sollen,

b) Zubereitungen zum äußeren Gebrauch -

Histrelin

Homatropin

Human-Plasmaproteine mit Faktor VIII-Inhibitor Bypass-Aktivität

Human-Plasmaproteine mit Faktor VIII korrigierender Aktivität

Hyaluronsäure

- zur intraartikulären Anwendung -

- zur intravenösen Anwendung bei Pferden -

Hydantoin und seine Derivate

- ausgenommen Allantoin -

Hydralazin

Hydrastinin

Hydrastiswurzelstock und seine Zubereitungen

- ausgenommen Zubereitungen, die je Milliliter nicht mehr als 1,21 mg Hydrastisalkaloide, berechnet als Hydrastin, enthalten, zum Auftragen auf die Mundschleimhaut -
- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Hydrochlorothiazid

Hydrocortison und seine Ester

- ausgenommen in Zubereitungen für den äußeren Gebrauch

- a) in einer Konzentration bis zu 0,25 % Hydrocortison oder Hydrocortisonacetat, berechnet als Hydrocortison und in Packungsgrößen bis zu 50 g,
- b) in einer Konzentration von über 0,25 bis zu 0,5 % Hydrocortison oder Hydrocortisonacetat, berechnet als Hydrocortison und in Packungsgrößen bis zu 30 g zur kurzzeitigen (maximal zwei Wochen andauernden) äußerlichen Anwendung zur Behandlung von mäßig ausgeprägten entzündlichen, allergischen oder juckenden Hauterkrankungen,
- c) in einer Konzentration von 0,2 % Hydrocortisonacetat in Kombination mit Natriumbitumino-sulfonat (hell) und in Packungsgrößen bis zu 20 g zur kurzzeitigen Anwendung zur Behandlung nicht infizierter, leicht ausgeprägter entzündlicher, allergischer oder juckender Hauterkrankungen,

und sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Beschränkung der Anwendung auf Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr angegeben ist –

Hydroflumethiazid

Hydroxocobalamin

- zur Behandlung einer bekannten oder vermuteten Zyanidvergiftung -

Hydroxycarbamid

8-Hydroxychinaldine, halogenierte und ihre Ester

- ausgenommen zur Anwendung in der Mundhöhle, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis bis zu 20 mg angegeben ist, und zum äußeren Gebrauch -

8-Hydroxychinoline, halogenierte und ihre Ester

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Hydroxychloroquin

Hydroxydion und seine Ester

17β-Hydroxy-17-methylestr-4-en-3-on (Methylestrenolon)

Hydroxyprogesteron

Hydroxystilbamidin

Hydroxyzin

Hygromycin A

Hyoscyami folium et herba und ihre Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Hyoscyamin

Hypophysenhinterlappen und seine Zubereitungen

Hypromellose

- zur Anwendung am eröffneten Auge -

Ibafloxacin

Ibandronsäure

Ibrutinib

Ibuprofen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch, außer als Pflaster, in Salben oder ähnlichen Zubereitungen in einer Konzentration bis zu 5 Gewichtsprozenten -
- ausgenommen zum äußeren Gebrauch als Pflaster ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Wirkstoffmenge bis zu 200 mg Ibuprofen je abgeteilter Arzneiform -
- ausgenommen zur oralen Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Konzentration bis zu 400 mg je abgeteilter Form und in einer Tagesdosis bis zu 1 200 mg bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber -
- ausgenommen in festen Zubereitungen zur rektalen Anwendung als Monopräparate in Einzeldosen bis 10 mg/kg Körpergewicht (bis zu einer maximalen Einzeldosis von 600 mg je abgeteilter Form) und in einer Tagesdosis bis zu 30 mg/kg Körpergewicht (bis zu einer maximalen Tagesdosis von 1 800 mg) bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber -
- ausgenommen zur oralen Anwendung in flüssigen Zubereitungen ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile für Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten in Einzeldosen bis zu 10 mg/kg Körpergewicht (bis zu einer maximalen Tagesdosis von 1 200 mg) bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber -
- ausgenommen zur oralen Anwendung in Dosen bis maximal 400 mg je abgeteilter Form und in einer maximalen Tagesdosis von 1 200 mg, zur rektalen Anwendung in festen Zubereitungen als Monopräparate in Einzeldosen bis 10 mg/kg Körpergewicht bis zur maximalen Einzeldosis von 600 mg je abgeteilter Form und bis zur maximalen Tagesdosis von 30 mg/kg Körpergewicht bzw. 1 800 mg, zur Behandlung der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne mit oder ohne Aura -
- ausgenommen zur oralen Anwendung (in maximaler Einzeldosis von 400 mg und in einer maximalen Tagesdosis von 1 200 mg) in Kombination mit Pseudoephedrinhydrochlorid (in maximaler Einzeldosis von 60 mg und in einer maximalen Tagesdosis von 180 mg) mit einer Wirkstoffmenge von insgesamt bis zu 720 mg Pseudoephedrin und 4 800 mg Ibuprofen pro Packung, zur Behandlung der akuten Rhinosinusitis im Zusammenhang mit weiteren Erkältungssymptomen (wie z. B. Fieber und Schmerzen) -
- ausgenommen zur oralen Anwendung (in maximaler Einzeldosis von 400 mg und in einer maximalen Tagesdosis von 1 200 mg) in Kombination mit Coffein (in maximaler Einzeldosis von 100 mg und in einer maximalen Tagesdosis von 300 mg), zur Behandlung von akuten mäßig starken Schmerzen bei Erwachsenen -

Icatibant

Idarubicin

Idebenon und seine Ester

Idelalisib

Idoxuridin

Idursulfase

Ifosfamid

Iloprost

Imatinib

Imepitoin

- zur Anwendung bei Tieren -

Imiclopazin

Imidapril

Imiglucerase

Imipenem

Imipramin

Imiquimod

Imolamin

Impfstoffe

- zur Anwendung am oder im menschlichen Körper; die Vorschriften der Tierimpfstoff-Verordnung zur Verschreibungspflicht bleiben unberührt -

Indacaterol

Indapamid

Indinavir

Indocyaningrün

Indometacin

- ausgenommen zur cutanen Anwendung in 1 %iger Lösung -

Indoramin

Indoxacarb

- zur Anwendung bei Tieren, ausgenommen zur Anwendung beim Hund -

Ingenolmebutat und seine Ester

myo-Inositolhexanitrat

Inotersen

Inproquon

Insulin, ferner Erzeugnisse, die aus der Bauchspeicheldrüse hergestellt und zu Einspritzungen bei Diabetes mellitus bestimmt sind

Insulin (vom Schwein)-Zink-Injektionssuspension, kristallin

- zur Anwendung bei Tieren -

Insulin aspart

Insulin defalan (vom Rind)

Insulin degludec

Insulin detemir

Insulin glargin

Insulin glulisin

Insulin lispro

Interferone

Intrauterinpessare

- zur Schwangerschaftsverhütung -

Iodethan

Iodlösungen und Zubereitungen aus Iod zur Herstellung von Iodlösungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

- ausgenommen in Zubereitungen zum inneren Gebrauch bei Tieren, wenn die gebrauchsfertige Lösung einen Gehalt von 5 % Iod nicht übersteigt -

Iodschwefel

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Iosarcol

lotrolan

- zur intravasalen Anwendung -

Ipecacuanhae radix und ihre Zubereitungen

Ipratropiumbromid und seine Ester

Iprazochrom

Iproclozid

Ipronidazol

- zur Anwendung bei Tieren -

Irbesartan

Irinotecan

Isavuconazonium-Salze und ihre Ester

Isoaminil

Isocarboxazid

Isoconazol

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Isoetarin

Isofluran

Isonicotinaldehyd und seine Derivate

Isonicotinsäure-hydrazid und seine Derivate

Isopentylnitrit

Isoprenalin

- ausgenommen Zubereitungen zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 0,5 Gewichtsprozenten -

Isopropamidiodid

Isosorbiddinitrat

Isosorbidmononitrat

Isotretinoin

Isradipin

Itraconazol

Ivabradin

Ivacaftor

Ivermectin und seine Ester

Ixazomib und seine Derivate

Jalapae resina et tuber und ihre Zubereitungen

Johanniskraut

- zur Behandlung mittelschwerer Depressionen -

Josamycin und seine Ester

Kalium

- zur parenteralen Anwendung in Konzentrationen von mehr als 6 mmol/l -

Kaliumbromid

- zur systemischen Anwendung -

Kaliumdichromat

Kanamycin

Kavain

Kava-Kava-Wurzelstock und seine Zubereitungen

- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach der Herstellungsvorschrift 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Kebuzon

Ketamin

Ketanserin

- zur Anwendung bei Tieren -

Ketoconazol

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Ketoprofen

Ketorolac

- zur Anwendung am Auge -

Ketotifen

- ausgenommen zur Anwendung am Auge in einer Konzentration von bis zu 0,025 % -

Kitasamycin

Kollagen

- zur Injektion -

Kontrastmittel

- zur Anwendung in der Röntgen-, Magnetresonanz- oder Ultraschalldiagnostik -

Kreosot

- ausgenommen Zubereitungen zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 50 Gewichtsprozenten -

Labetalol

Lacidipin

Lacosamid

Lactobacillus salivarius

Lactuca-virosa-Zubereitungen

Lamivudin

Lamotrigin

Landiolol

Lanreotid

Lansoprazol

Lanthan(III)carbonat

Lapatinib

Laronidase

Lasofloxifen und seine Ester

Latamoxef

Latanoprost

Lecirelin

- zur Anwendung bei Tieren -

Ledipasvir

Leflunomid

Lenalidomid

Lenograstim

Lenvatinib

Lepirudin

Lercanidipin

Lesinurad und seine Ester

Lespedeza capitata und ihre Zubereitungen

Letermovir und seine Ester

Letrozol

Leuprorelin

Levallorphan

Levamisol

Levetiracetam

Levobunolol

Levobupivacain

Levocetirizin

- ausgenommen in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung in Konzentrationen von 5 mg je abgeteilter Form, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Beschränkung der Anwendung auf Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr angegeben ist -

Levodopa

Levodropropizin

Levofloxacin

Levofolinsäure

Levonorgestrel

- ausgenommen in Zubereitungen zur oralen Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Konzentration bis zu 1,5 mg Wirkstoff je abgeteilter Arzneiform und in Packungen mit einem maximalen Wirkstoffgehalt von 1,5 mg zur Notfallkontrazeption -

Levosimendan

Lidocain

- ausgenommen Arzneimittel zur parenteralen Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Konzentration bis zu 2 % zur intrakutanen Anwendung an der gesunden Haut im Rahmen der Neuraltherapie -
- ausgenommen Arzneimittel zur subkutanen und intramuskulären Infiltrationsanästhesie zur Durchführung von Dammschnitten und zum Nähen von Dammschnitten und Dammrissen im Rahmen der Geburt in einer Konzentration von bis zu 1 %, einer Einzeldosis von bis zu 10 ml und einer Menge von bis zu 10 ml je Ampulle zur Abgabe an Hebammen und Entbindungspfleger im Rahmen ihrer Berufsausübung -
- ausgenommen Arzneimittel zum Aufbringen auf die Haut oder Schleimhaut, außer
 - a) zur Anwendung am Auge und am äußeren Gehörgang
 - b) zur Linderung von neuropathischen Schmerzen nach einer Herpes-Zoster-Infektion (Post-Zoster-Neuralgie) -

Lidoflazin

Linaclotid

Linagliptin

Lincomycin

Lindan

Linezolid

Lipegfilgrastim

Liraglutid

Lisinopril

Lisurid

Lithium

- zur Behandlung von Geisteskrankheiten und Psychosen -

Lixisenatid

Lobeliae herba und seine Zubereitungen

- ausgenommen zum Rauchen und Räuchern -

Lobelin

Lofepramin

Lomefloxacin

Lomitapid

Lomustin

Lonazolac

Loperamid

- ausgenommen in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung bei akuter Diarrhö in Tagesdosen bis zu 12 mg und in Packungsgrößen bis zu 24 mg, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen angegeben ist, dass die Anwendung auf Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr beschränkt ist -

Loperamidoxid

Loracarbef

Lorcainid

Lornoxicam

Losartan

Loteprednol

Lotilaner

- zur Anwendung bei Tieren -

Lovastatin

Loxapin

Lubiproston und seine Ester

Lufenuron

- zur parenteralen Anwendung bei Hunden und Katzen -

Lumacaftor und seine Ester

Lumefantrin

Lumiracoxib

Luprostiol

- zur Anwendung bei Tieren -

Lurasidon

Lutropin

Lutropin alfa

Lynestrenol

MACI (matrix-induced autologous chondrocyte implantation)

Macitentan

Macrogol

- zur Behandlung der Koprostase bei Kindern und Erwachsenen -

Macrogollaurylether (Polidocanol)

- zur Sklerosierung von Varizen und Besenreisern -

Mafenid und seine Verbindungen

Magnesiumbis(hydrogenaspartat)-Dihydrat

- zur intrakoronaren Anwendung -

Mandragora officinarum L. und Mandragora autumnalis Bertol, Wurzeln von
und ihre Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

- ausgenommen homöopathische Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den
Vorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Mangafodipir

Manidipin

Mannitolhexanitrat

Mannomustin

Maprotilin

Marbofloxacin

Maraviroc

Maropitant

- zur Anwendung bei Tieren -

Masitinib

- zur Anwendung bei Tieren -

Mavacoxib

- zur Anwendung bei Tieren -

Mazipredon

Mebendazol

Mebeverin

Mebhydrolin

Mecamylamin

Mecasermin

Meclocyclin

Meclofenaminsäure

- zur Anwendung bei Tieren -

- ausgenommen zur Anwendung bei Pferden -

Meclozin

Medetomidin

Medrogeston

Medroxyprogesteron und seine Ester

Medryson und seine Ester

Mefenaminsäure

Mefloquin

Mefrusid

Megestrol

Melagatran

Melatonin

Melitracen

Meloxicam

Melperon

Melphalan

Memantin

Mepacrin

Mephenesin

Mephentermin

Mepindolol

Mepivacain

Meproscillarin

Meptazinol

Mequinol

Mercaptamin

Mercaptopurin

Meropenem

Mertiatid

- als Trägersubstanz für (^{99m}Tc) Technetium -

Mesalazin

Mesna und andere Salze der 2-Sulfanylethansulfonsäure

Mesterolol und seine Ester

Mestranol

Mesuximid

Metaclozepam

Metacyclin

Metamfepramon

Metamizol

Metandienon und seine Ester

Metaraminol

Metaxalon

Metenolon und seine Ester

Metergolin

Metformin

Methacetin

Methacholin

Methallenestril

Methandriol und seine Ester

Methantheliniumbromid

Methazolamid

Methocarbamol

Methohexital

Methotrexat

Methoxamin

Methoxsalen

Methoxyfluran

Methyclothiazid

Methyl(5-amino-4-oxopentanoat)-hydrochlorid

Methyldopa

DL-Methyldopa

Methylergometrin

- ausgenommen zur Anwendung bei Nachgeburtsblutungen in einer Konzentration bis zu 0,3 mg/ml und einer Einzeldosis bis zu 1 ml zur Abgabe an Hebammen und Entbindungspfleger für den Praxisbedarf -

Methylnaltrexoniumsalze

3-Methyl-2-oxobutansäure

4-Methyl-2-oxopentansäure

(RS)-3-Methyl-2-oxopentansäure

Methylpentynol und seine Ester

2-Methyl-1-phenylbut-3-in-1,2-diol

Methylprednisolon und seine Ester

N-Methylscopolaminium-Salze

Methylsulfonal

Methyltestosteron und seine Ester

Methylthioninium-Salze

- zur parenteralen Anwendung beim Menschen -

Methysergid und seine Ester

Meticillin

Metildigoxin

Metipranolol

Metoclopramid

Metolazon

Metomidat

Metoprolol

Metreleptin

Metrifonat

Metronidazol und seine Ester

Metyrapon

Metyridin

Mexiletin

Mezlocillin

Mianserin

Micafungin

Miconazol

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch und zur Anwendung in der Mundhöhle -
- ausgenommen zur vaginalen Anwendung in Packungsgrößen mit einer Gesamtmenge von bis zu 1 043 mg Miconazol und für eine Anwendungsdauer bis zu 3 Tagen –

Migalastat und seine *N*- und *O*-Acyl-Derivate

Mikrobielle Collagenase

Midodrin

Midostaurin

Mifamurtid und seine Ester

Mifepriston

Miglitol

Miglustat

Milnacipran

Milrinon

Miltefosin

Minocyclin

Minoxidil

- ausgenommen zur topischen Anwendung bei androgenetischer Alopezie in einer Konzentration von bis zu 5 % -

Mirabegron und seine Derivate

Mirtazapin

Misoprostol

Mitomycin

Mitotan

Mitoxantron

Mitratapid

Mivacurium-Salze

Mizolastin

Modafinil

Moclobemid

Moexipril

Mofebutazon

Molgramostim

Molsidomin

Mometason und seine Ester

- ausgenommen Mometasonfuroat zur intranasalen Anwendung bei Erwachsenen zur symptomatischen Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis, nach der Erstdiagnose einer saisonalen allergischen Rhinitis durch einen Arzt, in einer Tagesdosis bis zu 200 Mikrogramm Mometasonfuroat, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen angegeben ist, dass die Anwendung auf Erwachsene beschränkt ist -

Monepantel

- zur Anwendung bei Tieren -

Monobenzon

Montelukast

Moperon

Morantel

- zur Anwendung bei Tieren –

Morazon
Moroxydin

Moxestrol

Moxidectin

Moxifloxacin

Moxonidin

Mupirocin

Mycophenolsäure

Myrtecain

- ausgenommen Arzneimittel zum Aufbringen auf die Haut oder Schleimhaut, außer zur Anwendung am Auge -

Nabumeton

Nadifloxacin

Nadolol

Nadroparin

- zur parenteralen Anwendung -

Nafarelin

Nafcillin

- zur Anwendung bei Tieren -

Naftalofos

Naftidrofuryl

Nalbuphin

Nalidixinsäure und ihre Ester

Nalmefen und seine Ester

Nalorphin

Naloxegol

Naloxon

Naltrexon

Naproxen

- ausgenommen in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Konzentration bis zu 250 mg je abgeteilter Form und in einer Tagesdosis bis zu 750 mg und in einer Packungsgröße bis zu 7 500 mg zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber -

Naratriptan

- ausgenommen zur Behandlung des Migränekopfschmerzes bei Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren, nach der Erstdiagnose einer Migräne durch einen Arzt, in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung in Konzentrationen bis 2,5 mg je abgeteilter Form und in einer Gesamtmenge von 5 mg je Packung -

Natamycin

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Nateglinid

Natriumaurothiomalat

Natrium-Goldchlorid

Natriumnitrit

Natriumzirconiumhydrogencyclohexasilicat-Hydrat (3:2:1:1:x)

Nebivolol

Nedocromil

- ausgenommen zur Anwendung bei saisonaler allergischer Rhinitis -
- ausgenommen zur Anwendung am Auge -

Nefazodon

Nefopam

Nelarabin

Nelfinavir

Neodym-3-sulfoisonicotinat

Neomycin

Neostigmin-Salze

Nepafenac

Netilmicin

Netupitant

Nevirapin

Nicarbazin

- zur Anwendung bei Tieren -

Nicardipin

Nicergolin

Niclofolan

Nicotin

- ausgenommen zur oralen (einschließlich der oral-inhalativen) Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Menge

a) bis zu 150 mg Nicotin je abgeteilter Arzneiform, wobei die Einzeldosis 1 mg Nicotin beträgt, und in einer Tagesdosis bis zu 64 mg oder

b) bis zu 15 mg Nicotin je abgeteilter Arzneiform und in einer Tagesdosis bis zu 64 mg

- ausgenommen zur transdermalen Anwendung als Pflaster ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Konzentration bis zu 52,5 mg Nicotin je abgeteilter Arzneiform bzw. auch in höheren Konzentrationen, sofern die Wirkstofffreigabe von durchschnittlich 35 mg Nicotin pro 24 Stunden nicht überschritten wird -

- ausgenommen zur Kombination der transdermalen Anwendung mit der oralen (einschließlich der oral-inhalativen) Anwendung bis zu einer maximalen Tagesdosis von 64 mg -

Nifedipin

Nifenalol

Nifluminsäure

Nifuratel

Nifurpirinol

Nifurpazin

Nifurstyrensäure

- zur Anwendung bei Tieren -

Nilotinib

Nilutamid

Nilvadipin

Nimesulid

- zur Anwendung bei Tieren -

Nimodipin

Nimorazol

Nimustin

Nintedanib

Niraparib

Niridazol

Nisoldipin

Nitisinon

Nitrendipin

Nitrofurantoin

Nitrofurantoin

Nitrofurathiazid

- zur Anwendung bei Tieren -

Nitroprussidnatrium

- zur intravenösen Anwendung -

Nitroscanat

- zur Anwendung bei Tieren -

Nitroxinil

Nitroxolin

Nizatidin

Nomegestrol und seine Ester

Nomifensin

Norelgestromin

Norepinephrin

- ausgenommen in Salben zum äußeren Gebrauch -

Norethisteron

Noretynodrel

Norgestimat

Norgestrel

Norgestrienon

Norfloxacin

Nortestosteron und seine Ester

Nortriptylin

Noscapin

Novobiocin

Noxiptilin

Nusinersen

Obeticholsäure

Obidoxim

Oclacitinib

- zur Anwendung bei Tieren -

Ocriplasmin

Octreotid

Öl von Hochseefischen (mit spezifizierter Zusammensetzung)

- zur parenteralen Ernährung -

Ofloxacin

Olanzapin

Olaparib

Oleander-Glykoside

Oleandomycin

Olmesartan und seine Ester

Olodaterol

Olopatadin

Olsalazin

Ombitasvir

Omega-3-Säurenethylester

- zur adjuvanten Behandlung zur Sekundärprophylaxe nach Herzinfarkt, zusätzlich zur Standard-Behandlung (z.B. Statine, Thrombozytenaggregationshemmer, Betablocker, ACE-Hemmer) -

Omeprazol

- ausgenommen zur Behandlung von Sodbrennen und saurem Aufstoßen in einer Einzeldosis von 20 mg und in einer Tageshöchstdosis von 20 mg für eine maximale Anwendungsdauer von 14 Tagen und in einer maximalen Packungsgröße von 280 mg Wirkstoff -

Ondansetron

Opicapon

Opipramol

Opiumalkaloide

- soweit die Verschreibung und Abgabe nicht durch die Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes in der jeweils geltenden Fassung geregelt ist -

Orazamid

Orbifloxacin

Orciprenalin

Orgotein

Oritavancin und seine Ester

Orlistat

- ausgenommen von der Europäischen Kommission zugelassene, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel zur oralen Anwendung mit einer Höchstdosis von 60 mg je abgeteilter Form sowie Arzneimittel zur oralen Anwendung mit einer Höchstdosis von 60 mg je abgeteilter Form und einer maximalen Tagesdosis von 180 mg -

Ornidazol

Orphenadrin

Osateron und seine Ester

Oseltamivir

Osimertinib

Osmiumsäure

Ospemifen und seine Ester

Oxabolon und seine Ester

Oxaceprol

Oxacillin

Oxaliplatin

Oxaprozin

Oxatomid

Oxcarbazepin

Oxetacain

Oxfendazol

- zur Anwendung bei Tieren -

Oxiconazol

- zur vaginalen Anwendung -

Oxidronsäure

- als Trägersubstanz für (^{99m}Tc) Technetium -

Oxitriptan

Oxitropiumbromid

Oxolin

Oxolinsäure

2-Oxo-3-phenylpropansäure

Oxprenolol

Oxybuprocain

Oxybutynin

Oxyclozanid

Oxymesteron und seine Ester

Oxymetholon

Oxypertin

Oxyphenbutazon

Oxyphencyclimin

Oxyphenisatin und seine Ester

Oxytetracyclin und seine Verbindungen

Oxytocin

- ausgenommen zur Anwendung bei Nachgeburtsblutungen in einer Konzentration bis zu 10 I.E./ml und einer Einzeldosis bis zu 1 ml zur Abgabe an Hebammen und Entbindungspfleger für den Praxisbedarf -

Ozenoxacin

Paclitaxel

Padeliporfin

Palbociclib

Palifermin

Paliperidon

Palonosetron

Pamidronsäure

Pancuroniumbromid

Panobinostat

Pantoprazol

- ausgenommen Arzneimittel in Packungsgrößen von nicht mehr als 14 abgeteilten Einheiten in einer Einzeldosis von 20 mg und in einer Tageshöchstdosis von 20 mg für eine kurzzeitige, ohne ärztliche Beratung auf maximal 4 Wochen und bei täglicher Einnahme auf maximal 2 Wochen begrenzte Behandlung von Reflux-Symptomen (z.B. Sodbrennen und saures Aufstoßen) bei Erwachsenen -

Papaverin

Paracetamol

- ausgenommen Humanarzneimittel zur

- a) oralen Anwendung zur symptomatischen Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen und/oder von Fieber in einer Gesamtwirkstoffmenge von bis zu 10 g je Packung und
- b) rektalen Anwendung

Paraflutizid

Paraldehyd

Paramethadion

Paramethason und seine Ester

Parathyroidhormon vom Menschen

Parbendazol

Parecoxib

Pargylin

Paricalcitol

Paritaprevir

Parnaparin

- zur parenteralen Anwendung -

Paromomycin

Paroxetin

Pasireotid

Patiomer

Patisiran

Pazopanib

Pefloxacin

Peforelin

- zur Anwendung bei Tieren -

Pegaptanib

Pegaspargase

Pegbovigrastim

- zur Anwendung bei Tieren -

PEG-Epoetin beta

Pegfilgrastim

Peginterferon alfa-2a

Peginterferon alfa-2b

Peginterferon beta-1a

Pegloticase

Pegvisomant

Pemetrexed

Penbutolol

Penciclovir

- ausgenommen zur äußeren Anwendung bei Herpes labialis in Packungsgrößen bis zu 2 g und einem Wirkstoffgehalt bis zu 20 mg je abgeteilter Arzneiform -

Penfluridol

Penflutizid

Pengitoxin

Penicillamin

Penoctoniumbromid

- ausgenommen in Lösungen, Salben und Pudern zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 0,1 Gewichtsprozent -

Pentaerithryltetranitrat

Pentagastrin

Pentamethonium-Salze

Pentamidin

Pentetreotid

Pentolonium-Salze

Pentorex

Pentosanpolysulfat

- zur oralen und parenteralen Anwendung -

Pentostatin

Pentoxifyllin

Perampanel

Perchlorsäure

Pergolid

Perhexilin

Perindopril

Permethrin

- zur Behandlung der Scabies beim Menschen -

- zur Anwendung bei Tieren, ausgenommen

a) als Ohrclip

b) zur Anwendung beim Pferd und beim Hund -

Peruvosid

Phenacemid

Phenamacid

Phenelzin

Pheneticillin

Phenglutarimid

Phenindion

Pheniprazin

Phenothiazin

Phenothiazin, am Stickstoff substituiertes

Phenoxybenzamin

Phenoxymethylpenicillin

Phenprobamat

Phenprocoumon

Phensuximid

Pentolamin

4-Phenylbutansäure

Phenylbutazon

Phenylephrin

- zur Anwendung am Auge, ausgenommen in flüssigen Zubereitungen bis zu 2,5 % -

[(Phenyl)(piperidin-2-yl)methyl]acetat

Phenylpropanolamin

- zur Behandlung des ernährungsbedingten Übergewichts -

- zur Anwendung bei Tieren -

Phospholipide

- zur parenteralen Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile -
- aus Rinderlunge -
- aus Schweinelunge -

Phosphor**Phoxim**

- zur Anwendung bei Tieren -

Physostigmin**Pibrentasvir****Picrotoxin****Pilocarpin****Pimecrolimus****Pimobendan**

- zur Anwendung bei Tieren -

Pimozid**Pinaveriumbromid****Pindolol****Pioglitazon****Pipamperon****Pipecuroniumbromid****Pipemidsäure****Pipenzolatbromid****Piperacillin****Piperaquin****Piperazin**, auch als Hydrat

- als Wurmmittel -

Piperidolat**Piperoxan****Piperylon****Pipofezin****Pipoxolan****Piracetam****Pirbuterol****Pirenzepin****Piretanid****Pirfenidon****Piribedil****Piridoxilat****Pirlimycin**

- zur Anwendung bei Tieren -

Piromidsäure

Piroxicam

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Pirprofen

Pitavastatin und seine Ester

Pitolisant

Pivampicillin

Pivmecillinam

Pixantron

Pizotifen

Plerixafor

Plicamycin

Podophyllin

Podophyllinsäure und ihre Derivate

Podophyllotoxin

Podophyllum-emodi- und Podophyllum-peltatum-Glykoside und ihre Derivate

Podophyllum-emodi radix et rhizoma und deren Zubereitungen

Podophyllum peltatum, radix et rhizoma und deren Zubereitungen

- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Polyestradiol

Polymyxin B und M

Poly-O-{3-[(2-aminoethyl)sulfanyl]propyl}_x-poly-O-[3-({2-[2-(D-mannopyranosyl)sulfanyl) ethanimidamido]ethyl)sulfanyl]propyl}_y-poly-O-{3-[(2-pentetamidoethyl)sulfanyl]propyl}_z-dextran 10 („Tilmanocept“)

- als Trägersubstanz für (^{99m}Tc) Technetium -

Poly(O-2-hydroxyethyl)stärke

- zur parenteralen Anwendung -

Poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonsäure (x:y)

als Aluminium-, Calcium-, Kalium- und Natriumsalz

- ausgenommen zur Verwendung als Hilfsstoff für galenische Zwecke in einer Tagesdosis bis zu 300 mg -

Polythiazid

Pomalidomid

Ponatinib

Porfimer

Posaconazol

Practolol

Pradofloxacin

- zur Anwendung bei Tieren -

Prajmalium

Pramipexol

Pramiverin

Pranoprofen

Prasteron und seine Ester

Prasugrel

Pravastatin

Praziquantel

Prazosin

Prednicarbat

Prednimustin

Prednisolon und seine Ester

Prednison und seine Ester

Prednyliden und seine Ester

Pregabalin

Prenoxdiazin

Prenylamin

Pridinol

Prifiniumhydroxid

- zur Anwendung bei Tieren -

Prilocain

- ausgenommen Arzneimittel zum Aufbringen auf die Haut oder Schleimhaut, außer zur Anwendung am Auge -

Primaquin

Primidon

Primycin

Pristinamycin

Probucol

Procain

- ausgenommen Arzneimittel zur parenteralen Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in Konzentrationen bis zu 2% zur intrakutanen Anwendung an der gesunden Haut im Rahmen der Neuraltherapie -

- ausgenommen Arzneimittel zum Aufbringen auf die Haut oder Schleimhaut, außer zur Anwendung am Auge -

Procainamid

Procarbazin

Procaterol

Procyclidin

Progesteron

Proglumetacin

Proglumid

Proguanil

Proligeston

Prolintan

Promegeston

Promestrien

Propafenon

Propamidin

Propanidid

Propantetraphosphonsäure

- als Trägersubstanz für (^{99m}Tc) Technetium -

Propanthelinbromid

Propicillin

Propiverin

Propofol

Propoxyphen

Propranolol

Propyl[3β-(benzoyloxy)tropan-2α-carboxylat]

- zur Anwendung am Auge -

Propylhexedrin

Proquazon

Prostalen

- zur Anwendung bei Tieren -

Protamin

(α₁)-Proteinaseinhibitor vom Menschen

Prothipendyl

Protionamid

Protirelin

Protokylol

- ausgenommen zum inneren Gebrauch, soweit der Gehalt in der Einzelgabe 1 mg nicht übersteigt -

Protriptylin

Proxymetacain

Prucaloprid

Pseudoephedrin

- ausgenommen Arzneimittel zur Anwendung beim Menschen mit einer Wirkstoffmenge von insgesamt bis zu 720 mg Pseudoephedrin pro Packung -

Pteropterin

Pulsatillae herba und seine Zubereitungen

- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Pyrantel

Pyrazinamid

Pyridostigminbromid

Pyrimethamin

Pyriprol

- zur Anwendung bei Tieren -

Pyrithion-Zink

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch

a) in einer Konzentration bis zu 0,2 %

b) in einer Konzentration bis zu 1 % in Zubereitungen, die wieder abgespült werden -

Pyrithyldion

Quecksilber und seine Verbindungen

- ausgenommen

1. 2-(Ethylmercurithio)benzoesäure, Natrium-Salz (Thiomersal)

a) in Tabletten bis zu 30 mg zur Bekämpfung der Nosema-Seuche,

b) bis zu 0,004 Gewichtsprozenten in Aufbewahrungs- und Benetzungslösungen für Kontaktlinsen,

2. 2-(Ethylmercurithio)benzoesäure und ihre Salze

Phenylmercuriacetat, Phenylmercuriborat, Phenylmercurinitrat

als Konservierungsmittel in einer Konzentration bis zu 0,002 Gewichtsprozenten in flüssigen Zubereitungen, Emulsionen und Salben,

3. Chininmercuribisulfat in einer Konzentration bis zu 2,75 Gewichtsprozenten

in Zubereitungen in Kleinpackungen zur Anwendung beim Mann zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten,

4. Phenylmercuriborat in einer Konzentration bis zu 0,1 Gewichtsprozent zum äußeren Gebrauch in Zubereitungen bis zu 50 ml bzw. 50 g –

Quetiapin

Quinagolid

Quinapril

Quinaprilat

Quinestrol

Quinethazon

Quingestanol

Quinisocain

- ausgenommen Arzneimittel zum Aufbringen auf die Haut oder Schleimhaut, außer zur Anwendung am Auge -

Quintiofos

Quinupristin

Rabeprazol

Racecadotril

- ausgenommen in festen Zubereitungen zur symptomatischen Behandlung von akutem Durchfall für eine maximale Anwendungsdauer von drei Tagen bei

1. Erwachsenen über 18 Jahren in Konzentrationen von 100 mg je abgeteilter Form und in einer Gesamtmenge von bis zu 1 000 mg je Packung,

2. Kindern ab dem vollendeten 12. Lebensjahr gemeinsam mit oraler Rehydratation in Konzentrationen von 30 mg je abgeteilter Form zur Herstellung einer Suspension und in einer Gesamtmenge von bis zu 540 mg je Packung, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen angegeben ist, dass die Anwendung auf Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr beschränkt ist,

sofern in der Fachinformation und in der Packungsbeilage

a) unter den Kontraindikationen angegeben wird, dass Racecadotril nicht angewendet werden darf bei Durchfällen, die mit Fieber, blutigem oder schleimigem Stuhl einhergehen, da diese auf das Vorliegen invasiver Bakterien oder anderer schwerer Erkrankungen hinweisen, oder die während oder nach der Einnahme von Antibiotika auftreten (pseudomembranöse Colitis), und

b) unter den Warnhinweisen angegeben wird, dass Racecadotril nur nach ärztlicher Verordnung angewendet werden sollte, wenn es sich bei dem Durchfall um einen akuten Schub einer Colitis ulcerosa handelt oder die Patienten unter einer Nieren- oder Leberinsuffizienz leiden -

Racefemin

Radionuklide enthaltende Stoffe und Zubereitungen zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken

Raloxifen

Raltegravir

Ramifenazon

- zur parenteralen Anwendung -
- ausgenommen zur Anwendung bei Tieren -

Ramipril

Ranelinsäure

Ranitidin

- ausgenommen in Zubereitungen zur oralen Anwendung in einer Konzentration von bis zu 75 mg je abgeteilter Form und in Packungsgrößen bis zu 1 050 mg, sofern die Anwendung für Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr auf die Anwendungsgebiete „Bei Sodbrennen und/oder saurem Aufstoßen“ und auf eine maximale Therapiedauer von 14 Tagen beschränkt ist -

Ranolazin

Rasagilin

Rasburicase

Rauwolfia-Arten, ihre Zubereitungen und Alkaloide

- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Reboxetin

Regadenoson

Regorafenib

Repaglinid

Reproterol

Reserpin

- Resocortol** und seine Ester
- zur Anwendung bei Tieren -

Resorantel

Retapamulin

Reteplase

Retigabin

Retinol und seine Ester

- zur Anwendung bei Menschen -

- ausgenommen zum inneren Gebrauch in Zubereitungen mit einer Tagesdosis bis zu 10 000 I.E. -

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Zubereitungen mit einer Tagesdosis bis zu 50 000 I.E. -

Reviparin

- zur parenteralen Anwendung -

Ribavirin

Ribociclib

Ribostamycin

Rifabutin

Rifampicin

Rifamycin

Rifaximin

Rilonacept

Rilpivirin

Riluzol

Rimazoliummetilsulfat

Rimexolon

Rimonabant

Riociguat

Risedronsäure

Risperidon

Ritodrin

Ritonavir

Rivaroxaban

Rivastigmin

Rizatriptan

Robenacoxib

- zur Anwendung bei Tieren -

Rocuroniumbromid

Roflumilast

Rolapitant

Rolitetracyclin

Romifidin

Romiplostim

Ronidazol

- zur Anwendung bei Tieren –

Ropinirol

Ropivacain

Rosiglitazon

Rosoxacin

Rosuvastatin

Rotigotin

Roxatidin und seine Ester

Roxithromycin

Rucaparib

Rufinamid

Rupatadin

Ruxolitinib

Sabinae oleum

Sabinae summitates und ihre Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Salben -

Sacubitril und seine Ester

Safinamid

Salbutamol

Salmeterol

Salpetersäure

- in Zubereitungen, die Essigsäure und Oxalsäure enthalten -

Salverin

Samarium(¹⁵³Sm)lexidronam

Santonin

Sapropterin (einschließlich seiner Stereoisomerenmische)

Saquinavir

Sarafloxacin

- zur Anwendung bei Tieren -

Saralasin

Sarolaner

- zur Anwendung bei Tieren -

Saxagliptin und seine Ester

Scammoniae resina und seine Zubereitungen

Schilddrüsenwirkstoffe

Schwefelhexafluorid

Scilla-Glykoside

Scopolamin

Scopoliawurzelstock und seine Zubereitungen

Sebelipase alfa

Secale-Alkaloide

Secale cornutum und seine Zubereitungen

Secnidazol

Secretin

- zur Anwendung als Diagnostikum -

Selamectin

Selegilin

Selenverbindungen

- ausgenommen Selendisulfid zum äußeren Gebrauch in einer Konzentration bis zu 2,5 Gewichtsprozenten -

- ausgenommen in Zubereitungen zum inneren Gebrauch mit einer Tagesdosis bis zu 70 µg Selen –

Selexipag

Semaglutid

Sera und monoklonale Antikörper

- zur Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper -

Sermorelin

Serrapeptase

Sertindol

Sertralin

Sevelamer

Sevofluran

Sibutramin

Silbernitrat

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch und in Augentropfen zur Blenorrhoeoprophylaxe -

Silberverbindungen

- zur Anwendung bei Erkrankungen des Magen-Darm-Kanals -

Sildenafil

Silibinin-C-2',3-bis(hydrogensuccinat)

- zur parenteralen Anwendung -

Silodosin

Simeprevir

Simvastatin

Sincalid

Sipuleucel-T

Sirolimus

Sisomicin

Sitagliptin

Sitaxentan

Sofosbuvir

Solifenacin

Somatorelin

Somatostatin

Somatropin

Sonidegib

Sorafenib

Sotalol

Spagluminsäure

- zur Behandlung der saisonalen Rhinitis -

Sparfloxacin

Sparteïn

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Spectinomycin

Spinosad

- zur Anwendung bei Tieren -

Spiramycin und seine Ester

Spirapril

Spironolacton und seine Ester

Stanozolol und seine Ester

Stavudin

Steinkohlenteer und seine Zubereitungen

Stickstoffmonoxid

Stilbamidin

(E)-Stiripentol

Strandkiefernrinde und ihre Zubereitungen

- mit einem Gehalt von mindestens 50 % Gesamtprocyanidine, berechnet als Cyanidinchlorid -

Streptokinase

- ausgenommen zur buccalen oder oralen Anwendung -

Streptomycin

Streptozocin und seine Derivate

Strophanthine

Strophanthi semen und seine Zubereitungen

Strychnin

Strychnin-N-oxid

Strychninsäure

Strychni semen und seine Zubereitungen

- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind -

Succimer

- ausgenommen in Kits zur Herstellung eines radioaktiven Arzneimittels -

Sucralfat

Sugammadex

Sulbactam

Sulfacarbamid und seine Derivate

Sulfaguanidin und seine Derivate

Sulfanilamid und seine Derivate

Sulfasalazin

Sulfinpyrazon

Sulfonal

Sulindac

Suloctidil

Sulodexid

- zur parenteralen Anwendung -

Sulpirid

Sulproston

Sultamicillin

Sultiam

Sumatriptan

Sunitinib

Suramin-Natrium

Suxamethonium-Salze

Suxibuzon

Syrosingopin

Tacalcitol

Tacrin

Tacrolimus

Tadalafil

Tafamidis und seine Ester

Tafluprost

Talastin

Talimogen laherparepvec

Talinolol

Tamoxifen

Tamsulosin

Tasimelton

Tasonermin
Taurolidin
Tazaroten
Tazobactam
Tedizolid und seine Ester
Teduglutid
Tegafur
Teicoplanin
Telaprevir
Telavancin
Telbivudin
Telithromycin
Telmisartan
Telotristat und seine Ester
Temocapril
Temoporfin
Temozolomid
Temsirolimus
Tenecteplase
Teniposid
Tenofovir und seine Derivate
Tenonitrozol
Tenoxicam
Tepoxalin
- zur Anwendung bei Tieren -
Terazosin
Terbinafin
- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -
Terbutalin
Terfenadin
Teriflunomid
Teriparatid
Terizidon
Tertatolol
Testolacton
Testosteron und seine Ester
Tetrabenazin
- zur Behandlung von dyskinetischen Bewegungsstörungen -
Tetracain

Tetrachlorethylen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Tetrachlorkohlenstoff

Tetracyclin und seine Verbindungen

4-*epi*-Tetracyclin

Tetraisopropylpyrophosphat

Tetrakis(2-methoxy-2-methylpropylisocyanid)kupfer(1+)-tetrafluoroborat

- als Trägersubstanz für (^{99m}Tc) Technetium -

Tetramisol

Tetrofosmin

Tetroxoprim

Tetrylammonium-Salze

Tezacaftor und seine Ester

Thalidomid

Thallium

Thenalidin

Theodrenalin

- zur parenteralen Anwendung -

Theophyllin

Theophyllin - (2-Amino-2-methylpropan-1-ol) (1:1)

Theophyllin-Ethylendiamin

Theophyllin-Magnesiumacetat

Therapieallergene

Thevetin

Thiamazol

Thiambutosin

Thiamphenicol und seine Ester

Thibenzazolin

Thiobarbitursäure-Derivate

Thiostrepton

Thiotepa

Thiouracil und seine Derivate

Thyroideae glandulae siccatiae und ihre Zubereitungen

Thyrotropin alfa

Tiabendazol

Tiagabin

Tiamulin

- zur Anwendung bei Tieren -

Tianeptin und seine Ester

Tiaprid

Tiaprofensäure

Tiaprost

- zur Anwendung bei Tieren -

Tibolon

Ticagrelor und seine Ester

Ticarcillin

Ticlopidin

Tigecyclin

Tildipirosin

- zur Anwendung bei Tieren -

Tiletamin

- zur Anwendung bei Tieren -

Tilmicosin

Tiludronsäure

Timolol

Tinidazol

Tinzaparin

- zur parenteralen Anwendung -

Tiocarlid

Tioconazol

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Tioguanin

Tiomesteron

Tiopronin

Tiotixen

Tiotropiumbromid und sein Hydrat

Tipiracil

Tipranavir

Tiracizin

Tirofiban

Tiropramid

Tivozanib

Tixocortol und seine Ester

Tizanidin

Tobramycin

Tocainid

Toceranib

- zur Anwendung bei Tieren -

Tocofersolan und seine Ester

- bei Vitamin-E-Mangel auf Grund digestiver Malabsorption bei pädiatrischen Patienten -

Tofacitinib

Tolazamid

Tolbutamid

Tolcapon

Tolciclat

Tolfenaminsäure

- zur Anwendung bei Tieren -

Toliprolol

Tolmetin

Toloniumchlorid (Toluidinblau)

- zur parenteralen Anwendung -

Tolperison

Tolterodin

Toltrazuril

Tolvaptan

Topiramat

Topotecan

Torasemid

Toremifen

Trabectedin

Tramadol

Trametinib

Trandolapril

Tranexamsäure

Transcalcifediol

Tranlycypromin

Trapidil

Travoprost

Trazodon

Treosulfan

Treprostinil

Tretamin

Tretinoin

Triacetyldiphenolisatin

Triamcinolon sowie seine Ester und Ether (einschließlich der Acetale)

Triamcinolonacetonid und seine Ester

- ausgenommen zur Anwendung als Hafttabletten bei rezidivierenden Aphthen -

Triamteren

Triaziquon

Tribenosid

2,2,2-Tribromethanol

Trichlormethiazid

Trichlormethin

Trichloroethylen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch -

Triclabendazol

Trientin

Trifluperidol

Trifluridin

Trihexyphenidyl

Trilostan

Trimegeston

Trimetaphan-Salze

Trimetazidin

Trimethadion

Trimethidiniummethosulfat

Trimethoprim

Trimethylolmelamin

Trimetozin

Trimipramin

Triparanol

Triperiden

Triptorelin

Trofosfamid

Troleandomycin

Trolnitrat

Tromantadin

Trometamol

- zur parenteralen Anwendung bei Störungen des Säure-Basen-Haushaltes oder zur Harnalkalisierung bei Intoxikationen oder bei einem Gehalt von über 1 g Trometamol je abgeteilter Arzneiform -

Tropalpin

- ausgenommen Zubereitungen zum inneren Gebrauch, soweit der Gehalt in der Einzelgabe 1 mg nicht übersteigt -

Tropenzilin

Tropicamid

Tropinbenzilat

Tropisetron

- zur Anwendung bei Chemotherapie-induziertem und postoperativem Erbrechen -

Trospium-Salze**Trovafloxacin****Tryptophan**

- zur Behandlung von depressiven Erkrankungen -

Tuberkuline, flüssige oder trockene, sowie alle sonstigen aus oder unter Verwendung von Tuberkelbazillen hergestellten Zubereitungen

Tubocurarin**Tulathromycin**

- zur Anwendung bei Tieren -

Tulobuterol**Tylosin**

Tylvalosin (Acetylisovaleryltylosin) und seine Ester

Ulipristal und seine Ester

- ausgenommen Ulipristalacetat in Zubereitungen zur oralen Anwendung ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in einer Konzentration bis zu 30 mg Wirkstoff je abgeteilter Arzneiform und in Packungen mit einem maximalen Wirkstoffgehalt von 30 mg zur Notfallkont-
razeption -

Umeclidinium**Unoproston-Isopropyl****Urapidil****Urethan****Urofollitropin****Urokinase****Ursodeoxycholsäure****Valaciclovir****Valdecoxib****Valdetamid****Valganciclovir****Valnemulin****Valproinsäure****Valsartan****Vancomycin****Vandetanib****Vardenafil****Vareniclin**

Vasopressin und seine Analoga

Vecuroniumbromid

Vedaprofen

- zur Anwendung bei Tieren –

Velaglucerase alfa

Velmanase alfa

Velpatasvir

Vemurafenib

Venetoclax

Venlafaxin

Verapamil

Veratri rhizoma und seine Zubereitungen

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch bei Tieren und als Schneeberger Schnupftabak mit einem Gehalt von höchstens 3 Gewichtsprozenten Nieswurzel -

Veratrum-Alkaloide

Vernakalant

Verteporfin

Vestronidase alfa

Vidarabin

Vigabatrin

Vilanterol

Vildagliptin

Viloxazin

Vinblastin

Vincamin

Vincristin

Vindesin

Vinflunin

Vinorelbin

Vinpocetin

Viomycin

Viquidil

Virginiamycin

Vismodegib

Vorapaxar

Voriconazol

Vortioxetin

Voxilaprevir

Warfarin

Xantocillin

Xenon

Ximelagatran

Xipamid

Xylazin

Yohimbinsäure und ihre Ester

Zalcitabin

Zaleplon

Zanamivir

Zellen menschlicher oder tierischer Herkunft in frischem, gefrorenem oder getrocknetem Zustand, soweit sie zur Injektion oder Infusion bei Menschen bestimmt sind

Zeranol

Ziconotid

Zidovudin

Zink

- ausgenommen

1. zum äußeren Gebrauch

2. in Augentropfen

3. zur oralen Anwendung

a) bei Menschen, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Tagesdosis angegeben ist, die einem Zinkgehalt bis zu 25 mg entspricht,

b) bei Tieren -

Zinkoxid zur oralen Anwendung

- ausgenommen in Tagesdosen bis zu 25 mg Zink -

Ziprasidon

Zofenopril

Zolazepam

- zur Anwendung bei Tieren -

Zoledronsäure

Zolmitriptan

Zonisamid

Zopiclon

Zorubicin

Zotepin

Zubereitung aus
Amitraz,
Fipronil
und
Methopren
- zur Anwendung beim Hund -

Zubereitung aus
Azelastin
und
Fluticasonpropionat

Zubereitung aus
Colfosceril,
1-Hexadecanol
und
Tyloxapol

Zubereitung aus
Emodepsid
und
Praziquantel
- zur Anwendung bei Tieren -

Zubereitung aus
Emodepsid
und
Toltrazuril
- zur Anwendung bei Tieren -

Zubereitung aus
Florfenicol
und
Flunixin
- zur Anwendung bei Tieren -

Zubereitung aus
Flumethrin
und
Imidacloprid
- zur Anwendung bei der Katze –

Zubereitung aus
Fluralaner
und
Moxidectin
- zur Anwendung bei Tieren -

Zubereitung aus
Gimeracil,
Oteracil und seinen Estern
und
Tegafur

Zubereitung aus
Imidacloprid
und
Permethrin
- zur Anwendung bei Hunden -

Zubereitung aus

Indoxacarb

und

Permethrin

- zur Anwendung bei Tieren, ausgenommen zur Anwendung beim Hund -

Zubereitung aus

Ivermectin

und

Praziquantel

- zur Anwendung beim Pferd -

Zubereitung aus

Lidocain

und

Prilocain

- zur Behandlung von primärer vorzeitiger Ejakulation bei erwachsenen Männern -

Zubereitung aus

Lufenuron

und

Milbemycinoxim

- zur Anwendung beim Hund -

Zubereitung aus

Marbofloxacin,

Clotrimazol

und

Dexamethasonacetat

- zur Anwendung beim Hund -

Zubereitung aus

Metaflumizon

und

Amitraz

Zubereitung aus

Methopren

und

Fipronil

- zur Anwendung bei Hunden und Katzen -

Zubereitung aus

Milbemycinoxim,

Lufenuron

und

Praziquantel

- zur Anwendung bei Tieren -

Zubereitung aus

Milbemycinoxim

und

Praziquantel

- zur Anwendung bei Hunden und Katzen -

Zubereitung aus

Nicotinsäure

und

Laropiprant

Zubereitung aus

Oxantel,

Praziquantel

und

Pyrantel

- zur Anwendung bei Tieren -

Zubereitung aus

Permethrin

und

Pyriproxifen

- zur Anwendung beim Hund -

Zubereitung aus

Sarolaner

und

Selamectin

- zur Anwendung bei Tieren -

Zubereitung aus

Xylometazolin

und

Ipratropiumbromid und seinen Estern

Zubereitungen aus Stoffen in pasten-, salben-, gelartiger oder ähnlicher Beschaffenheit sowie Emulsionen und Lösungen zur Einführung in die Gebärmutter und im Rahmen der Veterinärmedizin zusätzlich in Scheide und Euter der Tiere

Zuclopenthixol und seine Ester