

Datum der ersten Xyrem®-Verordnung:

KONTAKTINFORMATIONEN

Name und Telefonnummer des Patienten

Name und Telefonnummer des nächsten Angehörigen

Name und Telefonnummer des behandelnden Arztes

Kontaktnummer im Falle eines medizinischen Notfalles

Dieser Therapiepass ist verpflichtender Teil der Zulassung, um sicherzustellen, dass Patienten und Angehörige der Heilberufe, die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen.

6006317

XYREM
Natriumoxybat

FÜR PATIENTEN

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN



- Führen Sie diese Karte immer mit sich
- Zeigen Sie diese Karte allen an Ihrer Behandlung beteiligten Ärzten oder Apothekern
- Nehmen Sie eine Auflistung aller Medikamente, die Sie einnehmen oder anwenden zum Arztbesuch oder zur Apotheke mit
- Bitte informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie ungewöhnliche Krankheitszeichen wie etwa seltsame Gedanken, einschließlich Gedanken andere zu verletzen, unter der Einnahme von Xyrem® bemerken
- Bewahren Sie Xyrem® für Kinder unzugänglich auf

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Xyrem® kann zu einer Atemdepression (abgeflachte oder herabgesetzte Atmung) und Dämpfung des zentralen Nervensystems führen.

BITTE VERMEIDEN SIE unbedingt folgendes:

- Trinken Sie keinen Alkohol während der Behandlung mit Xyrem®
- Nehmen Sie nicht mehr als die von Ihrem Arzt verordnete Dosis ein
- Sie dürfen für mindestens 6 Stunden nach der Einnahme von Xyrem® kein Auto fahren oder schwere Maschinen bedienen
- Nehmen Sie keine anderen Medikamente ein, bevor Sie dies mit Ihrem behandelnden Arzt abgesprochen haben
- Geben Sie Xyrem® niemals an andere Personen weiter

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Dieser Patient nimmt Xyrem® zur Behandlung der Narkolepsie mit Kataplexie ein.

Xyrem® kann zur Atemdepression und Dämpfung des zentralen Nervensystems (ZNS), zu Krampfanfällen, psychotischen Ereignissen, Depression und Suizidgedanken oder -versuchen führen.

Opioide oder Barbiturate dürfen nicht in Kombination mit Xyrem® eingenommen/angewendet werden. Die gleichzeitige Einnahme/Anwendung anderer atemdepressiv oder das ZNS dämpfender Substanzen muss vermieden werden. Besondere Vorsicht ist bei gleichzeitiger Anwendung von Topiramate und Valproat in Kombination mit Xyrem® geboten.

Xyrem® hat das Potential für Missbrauch/unsachgemäße Anwendung/Abhängigkeit.

Bitte lesen Sie die Fachinformation zu Xyrem® bevor Sie diesem Patienten andere Medikamente verordnen/aushändigen.