

**EN**

ARIKAYCE liposomal (amikacin) may cause serious side effects.  
These may happen any time during treatment.  
You may experience more than one side effect at the same time.

**ARIKAYCE liposomal may be associated  
with the development of an allergic lung condition (allergic alveolitis)**

**CONTACT YOUR DOCTOR IMMEDIATELY if you develop any signs or symptoms such as:**

- Fever, cough, worsening breathlessness, weight loss
- Lung condition gets worse, affecting your breathing or overall health

Your doctor may give you other medicines to prevent more severe complications and reduce your symptoms.

Your doctor may decide to stop treatment.

**Important**

- Do not attempt to diagnose or treat side effects yourself.
- Please keep this card with you at all times, especially when you travel, whenever you go to the Emergency department, or when you must see another doctor.
- Be sure to notify any health care professional you see that you are being treated with ARIKAYCE liposomal and show them this card.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed on this card.

**ARIKAYCE liposomal start date**

**IT**

ARIKAYCE liposomiale (amikacina) può causare gravi effetti indesiderati.  
Questi possono manifestarsi in qualsiasi momento del trattamento.  
Si possono manifestare più effetti indesiderati contemporaneamente.

**ARIKAYCE liposomiale può essere associato**

**alla comparsa di una condizione polmonare allergica (alveolite allergica)**

**SI RIVOLGA IMMEDIATAMENTE AL MEDICO se compare un qualsiasi segno o sintomo dei seguenti:**

- febbre, tosse, peggioramento della sensazione di mancanza di respiro, peso diminuito
- peggioramento delle condizioni polmonari che compromettono la respirazione o la salute in generale

Il medico potrà prescriverle altri medicamenti per prevenire complicanze più gravi e per ridurre i sintomi.

Il medico potrebbe decidere di sospendere il trattamento.

**Attenzione**

- Non cerchi di diagnosticare o trattare da sé gli effetti indesiderati.
- La preghiamo di tenere questa scheda sempre con sé, specialmente in viaggio, se si reca al pronto soccorso o da altri medici.
- Informi sempre qualsiasi operatore sanitario che è in trattamento con ARIKAYCE liposomiale, mostrando questa scheda.
- Se compare un qualsiasi effetto indesiderato, anche non elencato su questa scheda, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

**ARIKAYCE® liposomal 590 mg**

**Amikacin/amikacina/amikacine**

**PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART**

**Belangrijke veiligheidsinformatie**

**CARTE D'ALERTE PATIENT**

**Informations importantes de sécurité**

**PATIENTENKARTE**

**Wichtige Informationen zur Sicherheit**

**PATIENT ALERT CARD**

**Important safety information**

**SCHEDA DI ALLERTA PER IL PAZIENTE**

**Importanti informazioni di sicurezza**

PX1065Y

**insmed®**

NL

ARIKAYCE liposomaal (amikacine) kan ernstige bijwerkingen veroorzaken.  
Die kunnen op elk moment tijdens de behandeling optreden.  
U kunt last krijgen van meer dan één bijwerking tegelijkertijd.

FR

ARIKAYCE liposomal (amikacine) peut causer des effets indésirables graves.  
Ces effets peuvent survenir à tout moment au cours du traitement.  
Vous pouvez présenter plus d'un effet indésirable en même temps.

DE

ARIKAYCE liposomal (Amikacin) kann schwerwiegende Nebenwirkungen hervorrufen.  
Diese können zu jedem Zeitpunkt während der Behandlung auftreten.  
Sie können gleichzeitig mehr als eine Nebenwirkung haben.

## ARIKAYCE liposomaal kan gepaard gaan met het ontstaan van een allergische longaandoening (allergische alveolitis)

NEEM ONMIDDELIJK CONTACT OP MET UW ARTS als u verschijnselen of klachten krijgt zoals:

- koorts, hoesten, toenemende kortademigheid, gewichtsverlies
- verergering van de longaandoening, wat invloed heeft op uw ademhaling of algehele gezondheid

Uw arts kan u andere medicijnen geven om ernstigere complicaties te voorkomen en uw klachten te verminderen.  
Uw arts kan besluiten om de behandeling te stoppen.

### Belangrijk

- Probeer niet om bijwerkingen zelf te diagnosticeren of te behandelen.
- Draag deze kaart altijd bij u, vooral als u onderweg bent, naar de spoedeisende hulp gaat of een andere arts moet bezoeken.
- Vertel elke zorgverlener die u bezoekt dat u met ARIKAYCE liposomaal wordt behandeld en laat deze kaart zien.
- Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u last krijgt van bijwerkingen. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet op deze kaart staan.

Startdatum ARIKAYCE liposomaal

## ARIKAYCE liposomal peut entraîner une affection pulmonaire de type allergique (alvéolite allergique)

CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN si vous présentez l'un des symptômes suivants:

- Fièvre, toux, essoufflement grandissant, perte de poids
- Dégradation de votre fonction pulmonaire affectant votre respiration ou votre état général

Votre médecin peut vous donner d'autres médicaments pour éviter des complications plus sévères et diminuer vos symptômes. Votre médecin peut décider de l'arrêt de votre traitement.

### Important

- N'essayez pas de vous diagnostiquer ou de vous traiter vous-même.
- **Bitte tragen Sie diese Karte stets bei sich**, insbesondere, wenn Sie verreisen, in die Notaufnahme müssen oder einen anderen Arzt aufsuchen müssen.
- **Conservez cette carte sur vous tout le temps**, notamment si vous voyagez, si vous vous présentez dans un service d'Urgences, ou si vous devez consulter un autre médecin.
- Informieren Sie unbedingt alle Ärzte bzw. sonstiges medizinisches Fachpersonal, dass Sie mit ARIKAYCE liposomal behandelt werden und zeigen Sie ihnen diese Karte.
- Prévenez tout professionnel de santé que vous consultez, que vous êtes traité avec ARIKAYCE liposomal et montrez-lui cette carte.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier(e). Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné sur cette carte.

Date d'initiation du traitement avec ARIKAYCE liposomal

## Unter der Behandlung mit ARIKAYCE liposomal kann sich eine allergische Lungenerkrankung (allergische Alveolitis) entwickeln.

WENDEN SIE SICH SOFORT AN IHREN ARZT, wenn es bei Ihnen zu einem oder mehreren der folgenden Krankheitszeichen oder Symptome kommt:

- Fieber, Husten, zunehmende Atemnot, Gewichtsverlust
- Verschlechterung der Lungenfunktion mit Beeinträchtigung der Atmung oder des Allgemeinzustands

Zur Vorbeugung schwererer Komplikationen und Linderung Ihrer Beschwerden verschreibt Ihr Arzt Ihnen gegebenenfalls weitere Arzneimittel. Ihr Arzt kann die Behandlung gegebenenfalls auch absetzen.

### Wichtig

- Versuchen Sie nicht, Nebenwirkungen selbst zu diagnostizieren oder zu behandeln.
- Bitte tragen Sie diese Karte stets bei sich, insbesondere, wenn Sie verreisen, in die Notaufnahme müssen oder einen anderen Arzt aufsuchen müssen.
- Informieren Sie unbedingt alle Ärzte bzw. sonstiges medizinisches Fachpersonal, dass Sie mit ARIKAYCE liposomal behandelt werden und zeigen Sie ihnen diese Karte.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht auf dieser Karte angegeben sind.

ARIKAYCE liposomal begonnen am