


Datum

Unterschrift

KOF-Bestimmung



ANLEITUNG:

Gewicht auf die Größe einstellen
KÖRPEROBERFLÄCHE am Pfeil ablesen

Körperoberfläche [m²]

nach der Formel von Dubois und Dubois
Arch Intern Med 1916;17:863

Bortezomib



Hinsichtlich Informationen zur Dosisanpassung beachten Sie bitte die Abschnitte zu den Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen, zur Dosierung und Art der Anwendung in der Fachinformation

REKONSTITUTION DER BORTEZOMIB 3,5-mg DURCHSTECHEFLASCHE			
i.v. Injektion			
Applikationsart	Packungsgröße	Rekonstitutionsvolumen	End-Konzentration
Intravenös	3,5mg	3,5ml	1,0mg/ml

REKONSTITUTION DER BORTEZOMIB 3,5-mg DURCHSTECHEFLASCHE			
s.c. Injektion			
Applikationsart	Packungsgröße	Rekonstitutionsvolumen	End-Konzentration
Subkutan	3,5mg	1,4ml	2,5mg/ml

Nur für den subkutanen oder intravenösen Gebrauch. Nicht über andere Verabreichungswege anwenden. Intrathekale Verabreichung hatten tödliche Ausgänge zu Folge

Verabreichungsart

Subkutane (s.c.) Verabreichung:

Die rekonstituierte Lösung wird s.c. in den Oberschenkel (rechts oder links, proximal oder distal) oder in das Abdomen (rechts oder links, oberer oder unterer Quadrant) injiziert.

Die Injektionsstellen sollen rotierend gewechselt werden.

Intravenöse (i.v.) Verabreichung:

Die rekonstituierte Lösung wird als i.v. Bolus über 3-5 Sekunden über einen peripheren oder zentralen intravenösen Katheter verabreicht, gefolgt von Nachspülen mit einer 0,9%igen NaCl-Lösung.

Beispiel

Körperoberfläche [m ²]	Erforderliche Dosis [mg] mit 1,3 mg/m ²	Injektionsvolumen subkutan [ml]	Injektionsvolumen intravenös [ml]
1,5	1,95	0,78	1,95
1,6	2,08	0,83	2,08
1,7	2,21	0,88	2,21
1,8	2,34	0,94	2,34
1,9	2,47	0,99	2,47
2,0	2,60	1,04	2,60
2,1	2,73	1,09	2,73

Art.Nr. 291765

Bortezomib

