


## KOF-Bestimmung



**ANLEITUNG:**  
 Gewicht auf die Größe einstellen.  
 KÖRPEROBERFLÄCHE am Pfeil ablesen.

Körperoberfläche [m<sup>2</sup>]

nach der Formel von Dubois und Dubois,  
 Arch Intern Med 1916;17:863.

## Bortezomib



Hinsichtlich Informationen zur Dosisanpassung beachten Sie bitte die Abschnitte zu den Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen, zur Dosierung und Art der Anwendung in der Fachinformation.

REKONSTITUTION DER BORTEZOMIB DURCHSTECHEFLASCHE			
Applikationsart	Packungsgröße	Rekonstitutionsvolumen	End-Konzentration
Intravenös	3,5mg	3,5ml	1,0mg/ml
Intravenös	2,5mg	2,5ml	1,0mg/ml
Intravenös	1,0mg	1,0ml	1,0mg/ml

i.v. Injektion

REKONSTITUTION DER BORTEZOMIB DURCHSTECHEFLASCHE			
Applikationsart	Packungsgröße	Rekonstitutionsvolumen	End-Konzentration
Subkutan	3,5mg	1,4ml	2,5mg/ml
Subkutan	2,5mg	1,0ml	2,5mg/ml

s.c. Injektion

Nur für den subkutanen oder intravenösen Gebrauch. Nicht über andere Verabreichungswege anwenden. Intrathekale Verabreichung hatten tödliche Ausgänge zu Folge.

## Verabreichungsart

### Subkutane (s.c.) Verabreichung: (Bortezomib 2,5mg oder Bortezomib 3,5mg)

Die rekonstituierte Lösung wird s.c. in den Oberschenkel (rechts oder links, proximal oder distal) oder in das Abdomen (rechts oder links, oberer oder unterer Quadrant) injiziert.

Die Injektionsstellen sollen rotierend gewechselt werden.

### Intravenöse (i.v.) Verabreichung: (Bortezomib 1,0mg oder Bortezomib 2,5mg oder Bortezomib 3,5mg)

Die rekonstituierte Lösung wird als i.v. Bolus über 3-5 Sekunden über einen peripheren oder zentralen intravenösen Katheter verabreicht, gefolgt von Nachspülen mit einer 0,9%igen NaCl-Lösung.

### Beispiel

Körperoberfläche [m <sup>2</sup> ]	Erforderliche Dosis [mg] mit 1,3 mg/m <sup>2</sup>	Injektionsvolumen subkutan [ml]	Injektionsvolumen intravenös [ml]
1,5	1,95	0,78	1,95
1,6	2,08	0,83	2,08
1,7	2,21	0,88	2,21
1,8	2,34	0,94	2,34
1,9	2,47	0,99	2,47
2,0	2,60	1,04	2,60
2,1	2,73	1,09	2,73

## Bortezomib



Hersteller  
 Merckle GmbH  
 Graf-Arco-Str. 3  
 89079 Ulm  
 Deutschland



Vertrieb  
 ratiopharm GmbH  
 Graf-Arco-Str. 3  
 89079 Ulm  
 Deutschland

