


KOF-Bestimmung



VELCADE[®]
(bortezomib)



ANLEITUNG:

GEWICHT auf die **GRÖSSE** einstellen.

KÖRPEROBERFLÄCHE am Pfeil ablesen.

Körperoberfläche [m²]



nach der Formel von Dubois und Dubois,
Arch Intern Med 1916;17:863.

Hinsichtlich Informationen zu Dosisanpassung beachten Sie bitte die Abschnitte zu den Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen, zur Dosierung und Art der Anwendung in der Fachinformation.

REKONSTITUTION DER VELCADE [®] 3,5-mg DURCHSTECHEFLASCHE			i.v. Injektion
Applikationsart	Packungsgröße	Rekonstitutionsvolumen	Endkonzentration
Intravenös	3,5 mg	3,5 ml	1,0 mg/ml

REKONSTITUTION DER VELCADE [®] 3,5-mg DURCHSTECHEFLASCHE			S.C. Injektion
Applikationsart	Packungsgröße	Rekonstitutionsvolumen	Endkonzentration
Subkutan	3,5 mg	1,4 ml	2,5 mg/ml

Janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES
OF *Johnson & Johnson*

Verabreichungsart

Subkutane (s.c.) Verabreichung:

Die rekonstituierte Lösung wird s.c. in den Oberschenkel (rechts oder links, proximal oder distal) oder in das Abdomen (rechts oder links, oberer oder unterer Quadrant) injiziert.

Die Injektionsstellen sollen rotierend gewechselt werden.

Intravenöse (i.v.) Verabreichung:

Die rekonstituierte Lösung wird als i.v. Bolus über 3–5 Sekunden über einen peripheren oder zentralen intravenösen Katheter verabreicht, gefolgt von Nachspülen mit einer 0,9%igen NaCl-Lösung.

Beispiel

Körperoberfläche [m ²]	Erforderliche Dosis [mg] mit 1,3 mg/m ²	Injektionsvolumen subkutan [ml]	Injektionsvolumen intravenös [ml]
1,5	1,95	0,78	1,95
1,6	2,08	0,83	2,08
1,7	2,21	0,88	2,21
1,8	2,34	0,94	2,34
1,9	2,47	0,99	2,47
2,0	2,60	1,04	2,60
2,1	2,73	1,09	2,73

VELCADE[®]
(bortezomib)

Janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES
OF *Johnson & Johnson*

