

Pradaxa® Dabigatranetexilat

- Führen Sie den Patientenausweis immer mit sich
- Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version verwenden

25.04.2014



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt hat bei Ihnen eine Behandlung mit Pradaxa® (Dabigatranetexilat) begonnen. Damit Sie Pradaxa® sicher anwenden können, beachten Sie bitte die wichtigen Informationen auf der Innenseite dieses Ausweises.

Dieser Patientenausweis enthält wichtige Informationen über Ihre Behandlung. Bitte tragen Sie ihn jederzeit bei sich, um medizinisches Fachpersonal über Ihre Einnahme von Pradaxa® zu informieren.

Pradaxa®
Dabigatranetexilat

1

Pradaxa®: Informationen für Patienten

- Halten Sie sich während der Behandlung mit Pradaxa® genau an die Anweisungen Ihres Arztes.
- Pradaxa® verhindert die Bildung von Blutgerinnseln, indem es das Blut verdünnt. Dies kann jedoch das Risiko für Blutungen erhöhen.
- Suchen Sie umgehend Ihren bzw. einen Arzt auf, falls eine Blutung nicht von allein aufhört.
- Im Falle eines Sturzes oder dem Zuziehen einer anderen Verletzung unter der Behandlung mit Pradaxa®, insbesondere Kopfverletzungen, sollten Sie bitte dringend medizinischen Rat suchen. Es könnte sein, dass Sie durch Ihren bzw. einen Arzt untersucht werden müssen, da bei Ihnen möglicherweise ein erhöhtes Blutungsrisiko besteht.

2

- Da Pradaxa® das Blutgerinnungssystem beeinflusst, werden am häufigsten Nebenwirkungen wie Blutergüsse oder Blutungen beobachtet. Symptome oder Anzeichen einer Blutung können Bluterguss, Teerstuhl, Blut im Urin, Nasenbluten oder ähnliches sein.
- Wenn bei Ihnen chirurgische oder invasive Eingriffe vorgenommen werden müssen, informieren Sie bitte den behandelnden Arzt über die Einnahme von Pradaxa®.
- Setzen Sie Pradaxa® nie ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt ab, da bei Ihnen durch die Bildung von Blutgerinnseln das Risiko eines Schlaganfalls oder anderer Komplikationen besteht.

3

- Im Falle einer Blutung suchen Sie bitte Ihren Arzt auf, bevor Sie die Einnahme von Pradaxa® abbrechen.
- Nehmen Sie Pradaxa® regelmäßig wie verschrieben ein und lassen Sie keine Dosis aus.
- Nennen Sie Ihrem Arzt alle Arzneimittel, die Sie zur Zeit anwenden.
- Pradaxa® kann unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden. Schlucken Sie die Kapseln im Ganzen mit einem Glas Wasser, um die Freisetzung im Magen zu gewährleisten. Sie dürfen die Kapseln nicht zerbrechen oder kauen und den Kapselinhalt nicht ausleeren, weil dies das Risiko für Blutungen erhöhen kann.

4

Pradaxa®: Informationen für medizinisches Fachpersonal

- Pradaxa® ist ein orales Antikoagulans, das eine direkte Thrombinhemmung bewirkt und hauptsächlich über die Nieren ausgeschieden wird.
- Im Falle einer chirurgischen oder einer anderen invasiven Maßnahme muss die Einnahme von Pradaxa® vorher unterbrochen werden (Einzelheiten siehe Fachinformation).
- Falls schwere Blutungen auftreten, muss die Einnahme von Pradaxa® sofort unterbrochen werden.

5

- Da Pradaxa® hauptsächlich über die Nieren ausgeschieden wird, muss eine ausreichende Diurese aufrecht erhalten werden. Pradaxa® ist dialysierbar, aber die klinischen Erfahrungen sind begrenzt (Einzelheiten dazu und nähere Informationen zur Aufhebung der antikoagulierenden Wirkung von Pradaxa® siehe Fachinformation).

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus oder bitten Sie Ihren Arzt es für Sie zu tun.

Patientendaten

6

(Vorname, Nachname)

(Geburtsdatum (TT MM JJJJ))

(Indikation für orale Antikoagulation)

(Dosierung von Pradaxa®)

7