

ÜBER IHRE BEHANDLUNG

Ihnen wurde der Gerinnungshemmer Lixiana verschrieben, der Ihr Blut verdünnt, um die Entstehung von Blutgerinnseln zu vermeiden. Es ist wichtig, dass Sie Ihr Arzneimittel genau wie von Ihrem Arzt verordnet einnehmen.

- Falls Sie eine Dosis vergessen haben, sollten Sie die vergessene Tabletteneinnahme sofort nachholen, sobald Sie sich daran erinnern, und am nächsten Tag die Einnahme wie gewohnt fortsetzen. Nehmen Sie an einem Tag nicht die doppelte verschriebene Menge ein.

- Beginnen Sie nicht mit der Einnahme anderer Arzneimittel (einschließlich rezeptfreier Arzneimittel) ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Brechen Sie die Einnahme von Lixiana nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt ab, da ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln bestehen kann.
- Lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation aufmerksam durch, die jeder Packung Lixiana beiliegt.

WANN SIE EINEN ARZT KONSULTIEREN SOLLTEN

BLUTUNGSRISIKO

Die Einnahme eines gerinnungshemmenden Arzneimittels wie Lixiana kann Ihr Blutungsrisiko erhöhen. Es ist daher wichtig, dass Sie die möglichen Anzeichen und Symptome von Blutungen kennen und **sofort** mit Ihrem Arzt sprechen, wenn eine der folgenden Beschwerden bei Ihnen auftritt:

- Blutergüsse oder Blutungen unter der Haut
- Blut im Urin
- Blutiger Auswurf
- Blutiges Erbrechen oder Erbrochenes, das wie Kaffeesatz aussieht

- Nasenbluten oder Schnittverletzungen, die lange nicht aufhören zu bluten
 - Teerfarbener Stuhl
 - Schwindel oder plötzliche Kopfschmerzen
 - Unerklärliche Müdigkeit
 - Ungewöhnliche Vaginalblutung, einschließlich verstärkter oder länger anhaltender Regelblutung
- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, falls ungewöhnliche Symptome bei Ihnen auftreten.

THERAPIEPASS

Lixiana®
Filmtabletten
edoxaban

Bitte tragen Sie diesen Therapiepass immer bei sich.

Legen Sie ihn vor jeder Behandlung und vor jedem Eingriff Ihrem Arzt, Apotheker, Chirurgen oder Zahnarzt vor.

DSDE 114256

49 mm

50 mm

51 mm

53 mm


52 mm


 Daiichi-Sankyo

Daiichi Sankyo Europe GmbH
Text & Design Management
Luitpoldstraße 1
D-85276 Pfaffenhofen

Format [mm]:	255 x 76 (Endformat 53 x 76)	Außen
Produkt:	PAC LIXIANA 15+30+60 FT	
Material:	DE 113015	
Laetus Code:	285	
Druckfarben:	Schwarz, PANTONE 233 C	
Datum:	07.09.2015 - 10:06	



ANGABEN ZUM PATIENTEN	INFORMATIONEN ZUR BEHANDLUNG	INFORMATIONEN ZUM VERORDNENDEN ARZT	INFORMATIONEN FÜR MEDIZINISCHES FACHPERSONAL	
Patientenname:	(Vom Arzt auszufüllen) Lixiana wurde verschrieben zur einmal täglichen Einnahme einer Dosis von: mg	Für weitere Informationen oder in einem Notfall wenden Sie sich bitte an:	<ul style="list-style-type: none"> Lixiana ist ein orales Antikoagulans, das den Faktor Xa hemmt. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerinnungstests wie INR, Prothrombinzeit (PT) oder aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) eignen sich nicht zur Messung der Wirkung von Lixiana. Ein kalibrierter Anti-Faktor-Xa-Assay könnte jedoch hilfreiche Informationen für klinische Entscheidungen liefern.
Geburtsdatum:	Behandlungsbeginn: / (MM/JJ)	Name des Arztes:	<ul style="list-style-type: none"> Falls ein invasiver Eingriff notwendig ist, muss Lixiana mindestens 24 Stunden vorher abgesetzt werden und es ist entsprechende Vorsicht geboten. 	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Fachinformation.
Benachrichtigen Sie im Notfall bitte folgende Person:	Blutgruppe:	Telefonnummer, Praxisstempel:	<ul style="list-style-type: none"> Lixiana kann das Blutungsrisiko erhöhen. Setzen Sie die Behandlung bei klinisch signifikanten Blutungen sofort ab. 	
Name:	Andere Arzneimittel/Erkrankungen:	Unterschrift des Arztes:		
Telefonnummer:				
52 mm	53 mm	51 mm	50 mm	49 mm

 Daiichi Sankyo Europe GmbH Text & Design Management Luitpoldstraße 1 D-85276 Pfaffenhofen	Format [mm]:	255 x 76 (Endformat 53 x 76)	Innen
	Produkt:	PAC LIXIANA 15+30+60 FT	
	Material:	DE 113015	
	Druckfarben:	Schwarz, PANTONE 233 C	
	Datum:	07.09.2015 - 10:06	

