

XXXX-XXX-XXX

Telefonnummer des behandelnden Arztes

Name des behandelnden Arztes

Name des Behandlungszentrums

Metabolisierungsstatus bzgl. CYP2D6

Datum der Erstverordnung von Cerdelga®

Name des Patienten

THERAPIEPASS

Informationen für den Patienten

Wenden Sie sich immer an den Arzt, der Eliglustat verschrieben hat, bevor Sie eine Behandlung mit anderen Arzneimitteln beginnen.

Verzehren Sie keine Grapefruit-Produkte.



▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung, daher sollte jeder Verdachtsfall einer Nebenwirkung gemeldet werden.

Informationen für medizinisches Fachpersonal

Dieser Patient nimmt Eliglustat (Cerdelga®) zur Behandlung des Morbus Gaucher Typ 1 (GD1) ein.

Eliglustat sollte nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln eingenommen werden, die einen Einfluss auf die Leberenzyme haben könnten, die eine Rolle im Eliglustat-Stoffwechsel spielen.

Die Verwendung von Eliglustat zusammen mit CYP2D6- oder CYP3A4-**Inhibitoren** kann zu einer Erhöhung der Plasmakonzentration von Eliglustat führen. Bei erheblich erhöhten Plasmaspiegeln sind geringfügige EKG-Veränderungen möglich.

Bei gleichzeitiger Einnahme von Eliglustat mit P-Glykoprotein (P-gp)- oder CYP2D6-**Substraten** kann die Plasmakonzentration dieser Wirkstoffe erhöht werden.

Die Einnahme von CYP3A4-**Induktoren** kann zur Verringerung der Wirksamkeit von Eliglustat führen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Fachinformation.