



SANDOZ A Novartis
Division



ERELZI® 25 MG INJEKTIONS-LÖSUNG
IN EINER FERTIGSPRITZE
ERELZI® 50 MG INJEKTIONS-LÖSUNG
IN EINER FERTIGSPRITZE

WIRKSTOFF: ETANERCEPT

KURZANLEITUNG



Sandoz GmbH,
Biochemiestraße 10,
6250 Kundl, Österreich

Lokaler Ansprechpartner:
Hexal AG, Industriestraße 25,
83607 Holzkirchen, Deutschland


Version 1.1 Art.-Nr.: 49032395; Stand: 12/2017

Diese Kurzanleitung wurde als Teil der Zulassungsaufgaben erstellt und behördlich genehmigt, um das Risiko von Medikationsfehlern bei der Anwendung von Erelzi® zu minimieren.

Lesen Sie vor der Anwendung der Erelzi® 25 mg bzw. 50 mg Fertigspritze die **Packungsbeilage** (Gebrauchsinformation) und hier insbesondere die Hinweise zur Anwendung in Abschnitt 7 genau durch. Lesen Sie die aktuelle Packungsbeilage bei jeder erneuten Ausstellung eines Rezeptes, da die Informationen sich ändern können.


Diese **Kurzanleitung** soll Ihnen einen raschen Überblick über die sichere und wirksame Handhabung der Fertigspritze verschaffen. Versuchen Sie **nicht**, sich selbst eine Injektion zu verabreichen, wenn Sie zuvor nicht von Ihrem Arzt, dem medizinischen Fachpersonal oder Ihrem Apotheker geschult wurden.

IHRE ERELZI® FERTIGSPRITZE MIT NADELSCHUTZSYSTEM UND ZUSÄTZLICHER FINGERAUFLAGE:




WAHL DER INJEKTIONSSTELLE:

- Vorderseite Ihrer Oberschenkel (empfohlen) oder unterer Bauchbereich, nicht jedoch in einem Bereich von 5 cm um den Bauchnabel herum
- Falls ein Betreuer oder medizinisches Fachpersonal Ihnen die Injektion verabreicht, kann diese auch an der Außenseite der Oberarme erfolgen.
- Nicht in Bereiche mit empfindlicher, geröteter, schuppiger oder harter Haut, Blutergüsse, Narben, Dehnungsstreifen oder Psoriasis-Hautläsionen injizieren.
- Wechseln Sie bei jeder Injektion die Injektionsstelle.




VORBEREITUNG FÜR DIE INJEKTION:

- Nehmen Sie die Blisterpackung mit der Fertigspritze 15–30 Minuten vor der Injektion aus dem Kühlschrank und lassen Sie sie ungeöffnet liegen, damit sie Raumtemperatur annimmt.
- Führen Sie folgende Sicherheitskontrollen durch:
 - Siegel der Blisterpackung ist unbeschädigt
 - Verfalldatum ist nicht überschritten
- Legen Sie Alkoholtupfer, Wattebausch oder Mull sowie einen Sicherheitsbehälter für die Entsorgung spitzer Gegenstände bereit.




- Wenn Sie für die Anwendung der Fertigspritze bereit sind, öffnen Sie die Blisterpackung und waschen Sie sich gründlich die Hände mit Wasser und Seife.
- Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer.
- Nehmen Sie die Fertigspritze aus der Blisterpackung. Achten Sie darauf, die Aktivierungsclips des Nadelstutzes nicht zu berühren.
- Führen Sie folgende Sicherheitskontrollen durch:
 - Aussehen der Lösung: klar oder leicht schillernd, farblos bis leicht gelblich, kann kleine weiße oder fast lichtdurchlässige Partikel enthalten
 - Fertigspritze ist unbeschädigt
 - Nadelstutzsystem ist nicht aktiviert


Einsatzbereit




Nicht verwenden




DIE INJEKTION:




- Nadelstutzkappe entfernen und entsorgen.




- Haut an der Injektionsstelle vorsichtig zusammendrücken und die Nadel einstechen und vollständig hineindrücken.




- Die Fingerauflage festhalten und den Kolben **langsam so weit wie möglich** hineindrücken, bis sich der Kolbenkopf zwischen den Aktivierungsclips des Nadelstutzes befindet. 5 Sekunden lang in dieser Position halten.



- Den Kolben vollständig gedrückt halten und die Nadel vorsichtig und gerade aus der Injektionsstelle herausziehen.



- Den Kolben langsam loslassen. Der Nadelstutz umhüllt automatisch die Nadel.
- Wenn an der Injektionsstelle Blut austritt, drücken Sie mit einem Wattebausch oder Mull 10 Sekunden lang auf die Injektionsstelle (nicht reiben). Falls nötig, können Sie die Injektionsstelle mit einem kleinen Pflaster abdecken.



ENTSORGUNG:

- Entsorgen Sie die gebrauchte Fertigspritze in einem Sicherheitsbehälter.
- Die Fertigspritze darf niemals wiederverwendet werden.

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie bitte mit einem Arzt, dem medizinischen Fachpersonal oder einem Apotheker, die/der mit der Erelzi®-Behandlung vertraut ist.